

ANDREAE THVRINI PISCIENSIS, ME
DICI APOSTOLICI, AD MAT-
THAEVM CVRTIVM TICI
NEN. DE VENA IN CV
RATIONE PLEVRI
TIDOS INCL-
DENDA.



SECVNDA IMPRESSIO.

ANDREAE THYNI THEOLOGICI
 DICI APOSTOLICI, AD MAT-
 THEVM CHRISTVM TICI
 NEN. DE VINA IN CA
 RATIONE PLVARI
 TIDOS INCP
 DENTA.
 SECVNDVM IMPRESSO.

ANDREAS THVRINVS PISCIE. PHYSICVS
MATTHAEO CVRTIO HIPPOCRATI/
CAE FACVLTATIS PRIMARIO
SE COMMENDAT ET S. D.



Vestionem de loco inafionis uene in
Pleuritico morbo, quam, te distante.
Auditores (ut scribis) ad amissim,
diligētissimeq; exæperunt, sæpe cum
maxima iucunditate plegi, erat enim
et sapientie, et claritatis abundas.
Et, licet ualidissimis tum authoritati
bus, tū rationibus sit opinio tua ual/
lata, quod primum est sapiētis opus,
non mentiri, non tamen eo caret ope/
re sapientis, quod est, mētientem pos/
se manifestare. Firmissima enim fun/
damenta ponis, quibus Medicorum cohors, et præficientium phalanx
opinionem tuæ oppositam erigit. Quæ tamen inualida, et corrue/
ntia demonstras. Non potui tamen calamum continere, et contrariam
opinionem iandiu erectam, et usu confirmatam non defendere, nō ut
tibi physicorum fulgentissimo, et eminentissimo, et amicorum optimo
contradicerem, do enim tibi in hac facultate libentissime manus, et her/
bam. Non etiam ad scribendum me impulit mundi gloria, et ut nostri
temporis mediā a fonte meo nouam aquam hauriant. Iandiu enim nō
solum iuniores, et recentiores Mediā, sed uetustissimi sapientes etiam
hāc, quam scribemus opinionem, copiosissime agnouerunt. Sed ob hāc
causam calamum sumpsi, ut hac mea oppositione ueritas elucescat ma/
gis, et tu ad altiora scribenda accēdaris, ut tua præclara uirtus iam
omnibus manifesta indies clarior euadat. Et, ne (cum lōgam sim dispu/
tationē factururus) longissinio utar præmio, iam in certamen descēdo.

¶ Nulli dubium esse debet mi Curti in operibus mediāne Galeni in/
uentam esse illam iandiu uulgatam diuisionem, uidelicet in A poster/
mate per modum fluxus generando, de hoc enim A postenatum genere
semper noster habendus est sermo, duplicem esse humorē, alterum, qui
fluens est, alterū quoque, qui fluxit. Galenus enim i compluribus locis
id testamento reliquit. Secūdo enim de arte curatiua libro dixit. Fluē/
A ij

DE INCISIONE VENAE IN PLEVRITIDE

tium igitur humorum, retractio. Sic enim Hippocrates nominat, eorū autem, qui iam membrum obsederūt, derivatio medela est. Et infra eodem libro dixit. Sic enim & aliud quodlibet patiens membrum inadimus, si non amplius humores influant. Tūc enim magis irritaueris, & malum duplaueris, Sed quando iam totum corpus expurgatum fuerit, neque iam aliud influit, aliquid uero, quod pridie influxerat, in membro continetur. Hęc Galenus. Idem etiam patet intuenti de Phlegmonia libellum, cum dixit. Nam in incipientibus quidem prohibere oportet, quod influit, in antiquatis uero euacuare, quod incoeatum est in patiente particula. Galeni itaq; sententia iam clara est, in Apostemate uidelicet generando, dum perfectam absolutionē non habet, duos esse humores, quos prudens medicus considerare debet. Alterum, qui iam fluxit, alterum, qui fluxurus est, & Apostema augmentaturus.

¶ Ducatur etiam ulterius sermo noster, & dicamus Galenum scriptis suis reliquisse, quod duplici existente hoc humore, & medicum duplicē habiturum solitudinem, alteram quidem circa fluētē humorem, quā praeuisuam nominat, alteram circa eum, qui fluxit, quā curatiua appellat, hoc enim facile patet intuenti librum de ingenio sanitatis. xiii. hoc modo docentem. Phlegmones uero, quę adhuc in generatione est, duplex indicatio est, ueluti in reliquis morbis omnibus, quicūque in gignendo adhuc sunt, nec dum absolutionem sunt nati. Nam quod eorum genitū iam est, id medię artis parti, quę morbos curat, subiicitur, quod in generatione adhuc est, parti, quę futurum morbum pręcauet. Atque ideo diximus non simplicem, sed compositam esse totā de his & gradinibus, quę in generatione adhuc sunt, medentis solitudinem, ex ea scilicet, quę prouidet, & ea, quę curat, Hęc Galenus.

¶ Dicantur etiam a nobis quę Galeni menti sunt conformia, uidelicet quod duplici existente hac tota medentis medię solitudine, ea, quę praeuisua est, quę fluentem humorem intuetur, prius usui mandatur, q̄ ea, quę curatiua dicitur, quę humorem, qui fluxit, suspicit. Subscripsit enim huic sententię Galenus eodem citato prius libro, cum dixit. Nunc ad sermonem de Phlegmone reuersi dicamus, communem omnium Phlegmonarum curationis indicationem esse uacuationem, quę uero adhuc in generatione sunt, prior uacuatione est cōsuetis ad affectū locum sanguinis inhibitiō. Inhibetur autem humor confluens, dicitur Galenus, remouendo causam, quę aliquando est in parte lesa, ut cum pars affecta est calidior facta, uel dolore urgetur. Aliquando uero non
ex ipsa

ex ipsa parte oritur fluxionis causa, sed in alia, alijsue locis ab affecta parte, quando ex alia aliqua particula, aut toto corpore superfluum illi transmittitur, Et parum infra subdit, His igitur omnibus estinatis, quæ in pblegmone adhuc in generatione sunt, earum causas prius abscondes, quæ uero iam factæ sunt, has utiq; curabis solas. Eandemq; protulit sententiam ipsemet. iii. Artis parua, cum scripsit. Ad hæc igitur animo, scilicet ut recurrat humor, & ut pars affecta euacuari possit, totum corpus euacuare oportet, aut omnino ad contraria loca retrahere, quod patienti particula influit, quo perfecto opere, prius a parte repellendum, mox dispergendum, quanto enim per minora fit, tanto expeditior est euacuatio. in quo loco Galenus manifeste prius præcipit diuersionem ad contrarium, quo perfecto opere, cõassit euacuationem a parte lesa. ¶ Nec silentio pertransibo, qd' liber de Arte curatiua docuit, duplicem uidelicet esse medelam duorum humorum, eius uidelicet, qui influit, medela est retractio, eius uero, qui fluxit, deriuatio medela est. Hunc enim locum superius citauimus, qui etiam locus nos admonet, deriuationem humoris, qui fluxit, fieri per euacuationem factam secundum refectionem patientis particula, quam Hippocra. Catbesim appellat, retractionem uero ad contrarium fieri, quod non solum locus ille demonstrat, sed Galeni uolumina copiose declarant. xiii. enim Therapeutica dixit commune præceptum in omnibus talibus esse in contrarium auersionis, & infra dixit, siquidem longissime a tentata fluxione parte auellere, nequaquam ad eam trahere oportet, & infra dixit, generandis autem adhuc uitjs minime his membris, quæ laborare incipiunt, sed, quæ continuata his sunt. Cucurbitula imponi debet auellendi in contrarium causa. Et infra dixit. Sic & omne aliud sanguinis profusum ad contrarium per communes uenas auertimus. Et in. v. de Ingenio, & tractatu de antispasi loquens de retractione, semper in contrarium facit, ut, si a dextra retrahere uolueris in sinistram, hoc agam, & e contrario. Et, si a sursum in deorsum, & e contrario, & si ab ante retro, & e contrario, & si ab intus extra, & e contrario. Rationem etiam huius sententia suffragantem adduxit, quia si ad locum, & particulam patientem humorem fluentem traxeris, malum duplaueris. Vbi etiam mandauit, quod ipse maxime liber de Arte curatiua secundus demonstrat, cum dixit, in locis muliebribus in contrarium trahes, si eas, quæ in cubito sunt, secueris uenas, aut mamillis Cucurbitulas apposueris, uel natus concalisceris, & fricueris, atq; alligaueris. Quis enim est, qui ne-

sciat & cubitum, & mammillas, & manus i superioribus partibus ad loca muliebria contrarietatem habere, eam uidelicet, quae secundum superiorius, & inferius nuncupatur. Nec etiam tacebo hoc duplex opus, retractionem scilicet, & deriuationem fieri per uenas communes, & coniuges particulae patienti. Frustra enim retrahere conabimur humorem a lesa parte, nisi id per uenas cum leso loco communionem habentes, atq; ei coniunctas fecerimus. Eodem modo, nisi per has, deriuare materiam a patiente particula non poterimus. Ad stipulatur etiam huic sententiae Galenus loco prius citato, cum dixit. Vtrūq; autem euacuationis genus per communes uenas fit.

¶ In medium autem asserere utile duxi. Retractionem, eam dico, quae per sanguinis missionem fit, non solum priorem esse deriuatiua euacuatione, sed multo tempore etiam praecedere, quando sola ipsa intendatur. Hoc nos monuit Galenus libello de Phlebotomia, cum dixit. Super ablationis uero deinceps tempus, in quibus euacuare quidem semper uoluerimus, etiam eodē die fiat, in quibus uero antispare etsi utique duobus eis, qui deinceps, diebus fiat, melius est. Retractio igitur fluxus humoris, cum sola queritur, tempore praecedit deriuatiua euacuationem, & per diem unum, uel plures.

¶ Illud etiam memoriae mandandum est, quod Galenus in libro de Venae incisione saepius meminit, utrumque scilicet euacuationis genus, & retractionis, & deriuationis fieri debere a Vena, quae est secundum rectitudinem patientis particulae, ex hac enim melior, & expeditior habetur tum retractio, tum deriuatio, & hoc est, quod Arabs dixit, retractionem fieri debere per unam diametrum, non per duas, infamauit enim Galenus, Si oculo dextro patiente ophthalmiam, fiat Phlebotomia in Cephalica sinistra, & contrario, Et in Apostemate Hepatis laudarunt Hippocrates, & Galenus iudicium factum per narem dextram, non per sinistram, & in Apostemate Splenis iudicium factum ex sinistra, non ex dextra, commendant enim tum naturae, tum artis retractionem, si ea fiat secundum rectitudinem patientis particulae, quae tantum erit secundum unam diametrum. Damnant autem, quae non secundum rectitudinem, sed per duas diametros fit, asserente Galeno quod talis nihil ualeat, uel & nocet quandoque in dissoluendo uirtutē, absque quod passionem leuet, quem forte locum olfaciens Princeps, cumque considerati placuisset sententia, quod uidelicet incisio uenae siue in retractione, siue in deriuatione melior, & expeditior est ea, quae secundum rectitudinem

dinem particulae patientis, conuertit se ad inuadendam Saphenam in lateris Apostemate, ex eodem tamen latere cum eo, In ea enim uidetur contrarietas secundum superius & inferius, quod requirit retractio, & est secundum rectitudinem, quod appetit expeditio, & melior euacuatio. Licet itaque Galenus nunquam sermonem fecerit de Saphena, eius tamen sententijs non repugnat, Sed forte magis ex illis sequi, & colligi uidentur.

Nec silebo, quae Galenus ex Hippocratis placitis in quarto de ingruo, capite. vi. in ulceribus enarrauit. Diuersis scilicet temporibus fluxionis humoris accommodari retractionem & deriuationem, Cum enim docuit secundum Hippocratis mandata retractionem fieri ad contrarium, deriuationem ad latus, subiunxit quo tempore auersio facienda, & quo modo, & dixit. Quare nunc quoque, si etiam nunc fluxio ualenter irruat, reuellere ad contraria studebimus utique, si in superioribus ulcus consistat, per infima purgantes. Sin autem in inferioribus sit, superiores uenae uacuantes. Deinde subiunxit quo tempore, & quomodo facienda est deriuatio, & dixit. At, si iam fluxio restitit, atque in membro inhaesit. deriuare per uicina magis expedit, Cum in propinquiore translatio fit, & purganti medicamento promptior tum accessus, tum attractus e vicino detur. Et paulo infra idem referens dixit. At, si petuum est, quod ab Hippocrate didicimus incipientem fluxionem ad contrarium trahendam esse, fixam uero iam in laborante particula uacuandam esse, uel ab ipsa particula, quae affligitur, uel a maxime uicina, in promptu nobis & de sanguinis detractio colligere nunc est, quod in principio haec e longinquo, postea ab ipsis exulceratis partibus sit emolienda, Haec Galenus, Patet itaque aliud faciendum esse in principio, quia diuersio ad contrarium, & aliud post principium, ut tempore status, quia deriuatio ad latus. Patrocinator huic sententiae textus Galeni in libro de Phlebotomia summa. ii. capite. vi. Cum dixit. In summa tamen dicendum est, quoniam incipientes quidem phlegmonas antispasmodice conuenit euacuare, diuturnas uero ex ipsis, si possibile fuerit, patientibus membris, Si uero non, ex proximis eis, & reddit causam huius duens. Incipientibus quidem, prohibere oportet, quod influit, in antiquatis uero euacuare, quod incuneatum est in patiente particula, & datus modum dicit, quod euacuabitur, hoc autem optime per copulatas uenas eis, quae in ipsa, & dicit, quod ratio, & experientia attestant huic, & exemplum sumens ab experientia dicit, quod in Phlegmo-

DE INCISIONE VENAE IN PLEVRITIDE

ne, quæ secundum Pharyngem, in principio quidem Phlebotomia, quæ secundum cubitum, post eam uero, quæ ab ipsa lingua, auxiliatur multum, in his anibabus, quæ sub ipsa, uenis. In quo exemplo primo ponitur Phlebotomia diuersa secundum cubitum, & post deriuatiua secundum uenas lingue, quæ in diuersis temporibus fiunt.

¶ Hec puto sufficere in firmanda communi Medicorum sententia iuxta Græcorum opinionem Hippocratis, & Galeni. Nunc uero quis sit Arabum assensus, & quæ communis Practicantium sententia dicere omitto dicturus tamē de Arabum opinione, pertractata ea, quæ Græcorum, Quæ uero communis sit opinio, quia omnibus nota, relinquitur, Solum in testimonium mei iudicii adducam Rabbi Moysen, & in fauorem practiciū, quæ Celsus scripsit. Dico itaque Rabbi Moysen in. xxv. particula suorum Aphorismorum, Galeni, & Hippocratis sententiam sub hac uerborum serie promulgasse, Galenus probauit in pluribus locis, quod materiæ Apostematum calidorum in principio sui fluxus, & tempore augmenti, & status sunt extrahende per oppositum, & diuersum, & statu completo, & humore non fluente in membrum, inunctato ibi, & in lapidem conuerso, extrahende sunt per idem membrum repletum, si fuerit possibile, uel per membra proxima magis sibi, & de hac radice satis Galenus, & Hippocrates sunt locuti, & hoc sanum est, & supra hanc radicem ars medicine totaliter est fundata, & ipsius utilitas experimento monstratur, & per hanc radicem ualde utilem præcepit Galenus Phlebotomare in fortibus & gritudinibus oculorum, Synanche, & similibus uenam Cephalicam in principio, & ipsi & gritudinibus prolongatis, & Apostematibus in lapidem conuersis, seu retentis cum membro, & confirmatis Galenus præcepit in & gritudinibus oculorum Phlebotomari uenâ superioris anguli oculi, uel uenam frontis, seu uenas, quæ sunt post aures, & in apostematibus gutturis, & uulvarum, uenas, quæ sunt sub lingua, & hoc manifeste sanum est. Hæc Rabbi Moyses.

¶ Vsum etiam communiter practiciū uidetur confirmare Cornelius Celsus inter latinos apprime doctus, qui libro suo. ii. capite. ix. dixit. Nec ignoro quosdam dicere, q̄ longissime sanguinem inde, ubi ledit, esse mittendum. Sic enim auerti materiæ cursum, at illo modo in id ipsum, quod grauat, euocari. Sed id ipsum falsum est, proximum enim locū primo exhaurit, ex ulterioribus autem eatenus sanguis sequitur, quatenus emittitur, ubi is suppressus est, quia non trahitur, nec uenit quidam

quidem, Videtur tamen usus ipse docuisse, si caput fractum est, ex brachio potius sanguinem mittendum esse, si quod in humero vitium est, ex altero brachio, credo quia si quid parum cesserit, opportuniore habet partes iniuriæ sunt, quæ quæ iam male habent. Hæc Celsus.

¶ Non etiam silentio prætermittam gloriosissimum Auerroar, qui huic fauere opinioni, cui debetur corona in medianâ, uixit enim. cxxxv. annos, et .xl. sue ætatis anno mederi cepit, et mortuus est cum bono intellectu, ut dixit Auerroes. Is. n. libro primo sui Thezir tractatus. xvi. c. a. iii. in cap. de pleuritide dixit. Et cura huius est phlebotomare infernum ex Basilica brachij oppositi, quæ quibusdam nonis mediis nostri temporis uideatur, quod sit minuendus ex ea parte et gritudinis, inducendum super hoc uerba logicalia, et sophistica, quod mihi nullatenus uidetur rationabile, neque uerum, immo credo ærtissime, quod facere illud omnino est mors infirmi.

¶ Nunc autem mi Curti ad ea me conuerto, quæ scripta sunt, et te legente ad unguem, ut scribis, excepta, in quibus hanc asseris conclusionem, In omni pleuritide in principio, corpore existente pleno, fieri debet phlebotomia ex Basilica lateris dolentis, hanc conclusionem cõnariis munire clarissimis Hippocratis authoritatibus in hunc modum, Hippocrates. ii. Re. acutorum textu. x. dixit. Cum dolor ascendit ad furculas, aut grauitas sit circa brachium, uel mammillam, aut pectus, quæ sunt supra septum transversum, phlebotomanda est Basilica, et in. iiii. re. acutorum, textu. lxxiii. dixit, inadere oportet uenam, quæ intus ad qualescunque partium fuerit, secundum hanc, siue secundum Copi translationem, ab eo latere, quod dolore fuerit affectum.

¶ His uir eximie facile respondemus asserentes Hippocratem docere uenam, quæ incidenda est in actu curatio, et non quæ incidenda est in actu præseruatio, harum prima respicit materiã, quæ fluxit siue in totum, siue in partem, et hæc debet non in principio fieri, sed in statu, et per rectitudinem patientis particule, et hæc est euacuatio, quam derivatiuam uocant Hippocrates, et Gal. quæ humorem, qui fluxit, intuetur. Venæ autem incisionem, quæ ad artem pertinet, quæ præseruatiua dicitur, quæ sit in principio, et ad partem contrariã particule patienti, et respectu humoris, qui actu fluit, quam Hippocrates retractionem uocat, ipse, ut breuiloquus, omisit, quia non intendebat dare præcepta, nisi ea, quæ ad artem pertinet curatiuam, cuiusmodi non est diuersiua, sed derivatiua phlebotomia, hanc nostram sententiam docet Hippo-

DE INCISIONE VENAE IN PLEVRITIDE

crates, & ratio, & opinio tua huic adminiculatur. Hippocrates cū p̄-
cepit textu. xi. qđ, dolore descendēte ad Hypochondria, detur pharma-
cia, nō eā intellexit dandā in principio, sed in statu, ut clare paulopost
dicemus, & sic posuit remediū illi generi pleuritidis, quod ad artē p̄ti-
net curatiuā, & Phlebotomia, q̄ fit in principio in omni inflāmatione,
ut clare etiā inferius dicemus, p̄supponitur, Et illa est Phlebotomia di-
uersa, ut modus curandi pleuritē apud placita Hippocratis euadat
in hāc formā. In principio inflāmationis cuiuslibet fiat Phlebotomia, &
ad cōtrariū, Phlebotomiā autē in qualibet inflāmatione faciēde memi-
nit. iiii. re. auctorū, textu. xix. ut dicitur infra, &, quod fiat hec ad cō-
trariū, meminit. iiii. Therapeuticę, capite. vi. post uero, cū ad statum
puenerit inflāmatio, distinguit Hippo. Si descendat ad Hypochondria, de-
tur pharmacū, si uero ascendat, fiat Phlebotomia ex eodem latere, ut
pharmacia, & Phlebotomia euacuet tēpore status p̄ eā partē, ad quā
inclinauit humor, ut fiat facilius, & magis expedita euacuatio. Ergo fa-
tis patet Hippo. hic loqui de pharmacia, & Phlebotomia, q̄ tpe status
cōueniūt, quę euacuatio nō diuersa, sed deriuatiua dicitur.

¶ Itē Phlebotomia, quā p̄cepit, Hippo. est simpliciter ad latus, cū mul-
ta cōtrarietas cadat inter particulā patiētē, & uenā, p̄ quā fit euacua-
tio, ergo est deriuatiua, & deductiua sola, patet per Hippo. ut cū dicit
Galenus. iiii. de ingenio capite. vi. dicens, qđ Hippo. iussit nos auertere
re ad cōtrariū, deriuare uero ad latus, Sed deriuatio est medela humo-
ris, q̄ fluxit, ut in lib. de arte curatiua citauimus, & est medela, qñ flux-
io restitit, ut. iiii. de ingenio cap. vi. etiā monuimus, Sed deriuatio,
& deductio humoris, q̄ fluxit, & qñ fluxio restitit, nō fit in principio,
sed in statu. Ergo Phlebotomia, quā hic p̄cepit Hippo. nō est ea, q̄ fit in
principio, sed ea, quę fit in statu, & quę ad artem p̄tinet curatiuā.

¶ Itē, si Hippo. p̄cepit Phlebotomiā in pleuritide, qñ dolor ascendit
ad furculas, ut euacuet p̄ partē, ad quā inclināt humor, ergo p̄ illam
Phlebotomiā humor nō diuertitur a loco leso, ad quē mouetur, sed de-
ducitur p̄ eundē locū, ad quē inclināt, Ergo illa Phlebotomia nō est di-
uersa, sed deriuatiua, Ergo nō fit in principio, sed in statu.

¶ Etiā ratio hoc idē uult. Nā aut Hippo. loquitur de retractiua eua-
cuatione, aut de deriuatiua, Si de deriuatiua, habeo intēnū, Si de deri-
uatiua nō intelligit Hippo. sed de retractiua, aut, si tibi magis placue-
rit, de retractiua, & deriuatiua simul, hoc (iquā) diū nō pōt, cū ubiq̄
retractiua ad contrarium fieri includat, Sed, cum Apositema fuerit in

dextro

dextro latere, & uena dextri lateris inciditur, inter particulā patiētē; & locū, p quē sit euacuatio, nulla reperitur cōtrarietas. Cōcludendum itaq; est, qđ de deriuatiua sermo ab Hipp. habetur, qđ non a principio, sed in statu, ut dictū est administratur.

¶ Suffragatur etiā huic nostrae opinioni id, qđ infra a te dicitur, nā, cū Rasis Pblebotomiā pcepit ex eodē latere, & maxime in cholerica, & nullā fecerat mentionē Saphenae, diās Rasm locutū fuisse de missio ne sanguinis solū deriuatiua, atq; euacuatiua humoris, qđ iā fluxit, & nō de diuersiua, siue retractiua, Cur mihi nō licet in expositione literae Hippocratis, cū dixit, fiat Pblebotomia ex Basilica ex eodē latere, qđ dolore affectum est, dicere qđ solum de deriuatiua intellexit, & nō de diuersiua, sicut & Rasm in simili scriptura intellexisse refert, Si autē tu idē in utroq; intellexisses, & uerā Hippocratis sententiā adduxisses, nec Arabes a Graecis sapientiss. & eorū magistris differre dixisses. Sed nos Arabū opiniones, qđ Graecis cōsentiāt qđq; ab eis nō discrepēt, facile, cū tēpus erit, manifestabimus. Patet itaq; tum Hippocratis auctoritate, tum ratione, tum dictis tuis uerū esse, quod diximus, hāc scilicet sanguinis missione, quā Hipp. pcepit, eā esse, qđ deriuatiua dicitur, nō eā, qđ retractiua. siue diuersiua nuncupatur, & hāc esse primā, & solā Pblebotomiā, quā Hippo. in arte curatiua scriptis suis reliquit.

¶ Quod uero ulterius obijcis, facile dissoluitur, inquis. n. tu, Hippocrates. ii. re. acutorum textu. xi. dixit. Si dolor declinat ad loca sub Diaphragmate, facienda est euacuatio cum pharmaco, & non cum pblebotomia, Sit igitur, diās tu, pleuritis dextri lateris, in qua dolor declinet ad loca, quae sunt sub Diaphragmate, euacuatio facta cum pharmaco trahit materiam per Hepar, ergo euacuat per eandem partem, non per partem oppositam, ergo eodem modo debet fieri pblebotomia, quae per idem latus euacuet.

¶ Dic quesito mi Curti, si dolor, & Apostema essent in parte sinistra, descenderentq; & declinarent ad loca sub Diaphragmate, dares ne pharmacum secundum Hippocratis sententiā? Certum est, qđ dares, Sed per te, & ueritatem materia cum pharmaco educenda traheretur per Hepar, ergo tu administrares pharmaciā trahētem ad oppositū, ergo, si sanguinis missio facienda esset, fieret ad oppositum. Si mihi respondes, ego & tibi responsum afferam.

¶ Sed ne uidear difficultatē effugere, quam forte tu reputas Achillem, dico, qđ intentio Hippocratis, cum exhibuit pharmacum, aut fuit ad

DE INCISIONE VENAE IN PLEVRITIDE

euacuandū materiam aētu facientem Apostema, & quae iam fluxit, & hoc minime potuit in principio fieri, cum uenerit. iiii. re. acutorū textus xix. dicens. Qui statim inter initia morbi inflāmatōnes medicamēto sol uere conantur, hi a distenta, inflāmataq; parte nihil auferunt, affectus uero, utpote crudus, nō remittitur, ac partes sanāe colliqueſcunt. Quo circa morbus imbecillū corpus uincens curationi nō obedit, Hec Hippocrates, Cui sententiā subscripsit Princeps. iiii. primi capite. iiii. in hūc modū. Cū autē humor fuerit in mēbro cōprehēsus, nullo modo moueatur, donec maturetur, & essentia habeat tēperatā, quam tu scinisti in loco suo, hēc Princeps. Ex his patere potest hoc tale phararmacū pceptū ab Hippocrate ratione humoris aētu faciētis Apostema, nō potuisse dari in principio, sed in statu, & materia digesta. Et, cū tu arguis, ergo eodē modo debet fieri phlebotomia q̄ per idē latūs euacuet, cōcedo in statu, & nō in principio, q̄a in tali tēpore status debet fieri phlebotomia ad euacuandū materiā, q̄ fluxit, q̄ p derivatiuā phlebotomiā euacuatur, q̄ sit secūdū rectitudinē patiētis lateris, si uero hoc phararmacū Hippocrates dedit ad euacuandū materiā antecedentē, ut q̄ a stomacho, & Hepate uadit, & attrahitur ad locū sub costis meridosis, tunc poterit dari hoc phararmacū in principio, q̄a ad diuertēdū. Sed talis euacuatio est diuersua, cū ad contrariā partē transmittatur materia, q̄a, ubi fluxura erat ab Hepate ad locū sub costis, p phararmacū administratum retrahetur ab Hepate uersus intestina p Meseraicus, & sic fiet eius diuersio ad cōtraria, Ergo, si in principio praeiperetur uenae incisio pro materia antecedente, & fluēte, illa deberet fieri ad cōtrariū, & nō ex eodē latere, Licet igitur sit primū remediū, qd̄ Hippocrates adduāt, id intelligēdū est in aētu curatio respectu materiæ, quæ fluxit, & nō in aētu pseruatio, qd̄, tanq̄ breuiloquus, reliquit, Qd̄ si Apostema esset in sinistro, ut in casu, quē nos cōstituimus, dicimus, in principio nō cōuenire phararmacū illud, q̄a solutiū nō recte administratur i principio respectu humoris, q̄ fluxit, Sed, si in statu utamur hoc ingenio curadi, licet trahat ad partē oppositā ipsam materiā p Hepar, non tamē illo tēpore utimur hoc solutino pharmaco, ut retractino, sed ut euacuatio p illas partes a natura inuentas, ut per ipsas fieri possit euacuatio talis.

¶ Quod uero de fomēto adduātur, facile diluitur, Tale. n. auxiliū suis se administratū tentadi gratia ipsemet Hippocrates refert, cū dicit, lateris dolorē, siue is protinus a principio, siue postea abortus est, nō ab re fuerit tentare tepidis fomentis dissolucere, Talia autē remedia, quibus tentamus,

tentamus, quocumq; morbi tēpore afferri possunt, ut ipsemet Hippocrates in textu promittit. Sed id mihi profecto mirū uidetur, cū afferis Medici cū nō bene posse scire, qm̄ materia nō amplius fluit, & sic nō posse unq̄ scire quid agere deberet, Sed dic (quæso) cur nō potest scire tēpora ipsius A postematis p̄ indiāa, & signa? Et, si sciuerit, cur nō sciat qd̄ in diuersis tēporibus diuersimode sit operandū? profecto sapiēs Medicus scit, quando materia partim fluxit, ut in principio, & augmento, & quādo tota fluxit, ut in statu, & sic scit quid agendum.

¶ Cū uero Hippocrate sic distinguente adduās, aut dolor ascendit ad Furculas, aut descendit sub Diaphragma, & si descendit, nult nullā esse faciendā pblebotomiā, ergo nō p̄supponit semp̄ factā esse pblebotomiā, Si. n. uellet (inquis) pblebotomiā faciendā esse diuersiā, dolore descēdente, cōcessisset pblebotomiā eiusdē lateris, quā tñ negauit, Sicut. n. (iq̄ tu) i A postemate Hepatis pblebotomia eiusdē lateris ē diuersiua, ita in Pleuritide, qm̄ dolor descendit ad loca sub Diaphragmate.

¶ Miror uir eximie, quomodo ex eo, qd̄ Hippocrates in tali casu pblebotomiā tacerit, eā negasse affirmes, Qui. n. tacet, nihil dicit affirmādo, aut negādō. Sed, an sit negāda, docuit Hippocra. iiii. re. acutorum textu. xviii. Inflāmata p̄cordia, Septi trāuersum non ab inclusis flatibus intentū, arida suspiria, qbus pus non subiret, sed, ubi flatuū clausura hmoi affectus sunt, potissimū uero Iecoris dolores, Lienis grauitas, ac reliquæ inflāmationes, itē Septi trāsuerſi dolores, & morborum cōuersiones solui nō possunt, si protinus ab initio medicamētis curatio nē aggredieris, Nā p̄cipuū in his ppositū est in primis sanguinē detrabere, deinde Clysterē exhibere, idq; si magnus, uehemēsq; fuerit morbus, Si uero nō ita fuerit uehementis, medicamento curetur, quod tute, moderateq; misso prius sanguine, adbibendū est.

¶ Sed nōne Gal. i cōmēto, qd̄ ritasti, dixit, oportet ergo, ut caueas cautela uehemēti ad hoc, ut des mediānā solutiūā, & utare euacuatione p̄prie p pblebotomiā, quā dolor puenit ad loca, quæ sunt sub Hypochondrijs, Inuamentū. n. quā ex ea sit minus, q̄ sit ex solutione, uerū tamē fidutiā in ea est uehemētior, Immo in euacuatione p pblebotomiā nō audit aliqd̄ timoris, in solutione autē accidit timor multoties, & p̄prie, cū nō fuerit cognitor naturæ infirmī, quomodo ergo Gal. nūq̄ cōtradicens Hippocrati cōcessit pblebotomiā, si Hippocrates uoluit nullā esse faciendā, cū etiā Hippocrates in omni tali A postemate, & omni bus inflāmationibus cōcessit pblebotomiā, & nō pharmanā in princi-

DE INCISIONE VENAE IN PLEVRITIDE

pio morbi adducens causam, quā supra diximus, cū statim sabiunxit, Qui. n. inter initia morbi &c. Quod autē dictū est, qđ sicut in Aposmate Hepatis sit diuersua euacuatio, & pblebotomia ex eodē latere, similiter fieri deberet in pleuritide, dicitur infra, ubi hoc pro ratione adducis.

¶ Cū autē Hippocratis opinionē pertractauerimus, & sensum uerborū eius dilucidauerimus, modo deueniendū est ad eas, quas adducis, Gale ni auctoritates. Cū autē eius, qđ citatur in. xiii. Therapeuticæ, inferius sim copiose mētionē facturus, ad id tantū me cōuertā, quod libello. de pblebotomia scriptū Galenus reliquit, p̄sertim cū dixit, At quidē dein de & in Pleuritide, qđ secundū rectitudinē patiētis lateris, pblebotomia inuamē euidentissimū ostēdit multoties, Quæ uero ex opposita manu, uel parū, uel omnino post tēpus. Et infra dixit, doloresq; multoties oculorū fortissimos infra horā unā sedauit, qđ secundū rectitudinē, pblebotomia, humerali uocata uena incisa, hęc Gal. Ista est una de potissimis auctoritatibus, & locis, qđ multos illaqueāt nō cōsiderātes Gal. in eo loco nō ex pposito determinasse, ex quo loco pblebotomādū sit in costali morbo. Sed tamē id, quod scripsit, si recte fuerit intellectū, uerum est. Declarat. n. Gal. ex Hippocratis auctoritate, qđ pblebotomia facta secundū rectitudinē patiētis lateris maximū affert inuamentū, Vnde siue in euacuatione, quæ sola deriuatiua est, siue in ea, quæ & deriuatiua, & retractiua est, semp, ubi possit fieri ex uena secundū rectitudinē patientis partis, sit melior, & expeditior euacuatio. Pblebotomia autē, cuius mētionē fecit in hoc loco in pleuritide, est deriuatiua; qđ nō fit in principio, & est ea, qđ p̄tinet ad curatiuū actū, & in hac nō est quæstio, quā nullo modo in principio fieri pōt; Cū igitur dixit, se inuenisse inuamentū maximū in pleuritide facere pblebotomiā ex uena, qđ est secundū rectitudinē patiētis lateris, in actū curatiuū intellexit, nec tamē tenuit, qđ in opposita parte nō fieret inuamentū, licet asseruerit, qđ in ea parte facta pblebotomia parū inuat, aut post tēpus, quia in actū curadi parū inuat illius uene incisio, quæ humorē, qđ fluxit, nō euacuat ad extra, licet ipsum ab euacuet. Nec id, qđ dixit eo loco, Gal. dixit se fecisse in principio, ut ponit cōclusio tua. Eodē modo soluitur id, qđ dictū est in egritudinibus oculorū, nā stāte suppuratione in dextro oculo, si uena incidatur humeralis, qđ i dextro brachio est, inuamentū facit maximū quia hęc est secundū rectitudinē patiētis particula, Si uero in hmoi suppuratione fiat uenæ incisio, qđ i sinistro est, hęc (inquā) nec inuat quicquid, uel post tēpus

tēpus, immo nocet, Quia talis retractio est secundū duas diametros, in eā uidelicet, q̄ est secundū superius, & inferius, & in eā, q̄ est secundū dextrū, & sinistrū, & hoc modo procedere est error, & hoc est, quod Galenus damnat timens uirtutis dissolutionē.

¶ Qd̄ uero p̄ aliquorū respōsione adduxis, ut, qd̄ dicitur secundū rectitudinē, nō designet ab eodē latere, imo qd̄ phlebotomia facta i dextro, si A postema sit in sinistro, dicatur facta secundū rectitudinē, q̄a ad latere ad latus est uia recta, p̄fecto Curti doctissime, ac sapiētissime redarguis, & Galenus sententiā, quā adduxis, usui mādauit, p̄sertim in. ii. de arte curatiua dixit. Detrahatis aut̄, si eas, quę in genibus, aut tallo, uenas diuiseris, & cucurbitulas coxis applicueris, & crura cauteris, ac perficeris, atq; alligaueris, & subdit. Et, si qd̄ in parte dextra locorū passio fuerit, dextra manu, aut crure detraheris sanguinē, Si uero in sinistra, a manibus, quę illi in directo sunt, quod ab Hippocrate Cathefim dicitur, hoc ipsum est secundū rectitudinē, Hec Gal. Quę itaq; mihi uidentur Græcorū opinionibus cōsona hęc sunt.

¶ Destruēto aut̄ fundamēto, quod auctoritatibus Hippocratis, & Galeni innitēbatur, reliquū est, ut argumētationibus respondeamus, & respōsiones tuas ad ea, q̄ tibi obicis, asseremus, Argumētari argumēto tāte efficacie, ut multos errare id fecerit. Diis. n. Idē est iudiciū de A postemate Hepatis, & pleuritide dextri lateris, in qua dolor descendit ad Hypochondria, & in his duabus & gritudinibus eodē modo faciēda Phlebotomia, Sed in A postemate Hepatis faciēda est ex Basilica dextri lateris, ergo &c. Qd̄ si non sit eodem modo faciēdum in utroq; casu, assignetur ratio diuersitatis.

¶ Huic rōni primo respōdemus repetētes, q̄ tu i auctoritate Hippocratis supra adduxisti, uidelicet Hippocratē negare phlebotomiā esse faciēdā in tali pleuritide, quādo descendit dolor ad Hypochondria, Si itaq; nulla cōpetit phlebotomia, ut placuit Hippocrati secundū tuā sententiā, quomō ergo est simile iudiciū in uno casu, sicut in altero, in phlebotomia faciēda; Qd̄ si de eo gñe Costalis morbi fiat sermo, q̄ ad Furculas ascendit, credo te facile daturū cām diuersitatis, q̄a inrētiōne diuertēdi, phlebotomia i Hepatis A postemate fiat ex eodē dextro latere, nō aut̄ i pleuritico morbo, Ista itaq; tua argumētatio mis solis fūdāmētis tuit, Sed nos q̄ i utroq; pleuritico morbo ascendēte, descendēteq; uene iāsiōnē cōuenire diximus, rō hęc maxime angit, & torquet. Sapiētū rñ prius narrata opinione, dicemus, q̄ Galeni decretis nobis uidētur cōformia.

DE INCISIONE VENAE IN PLEVRITIDE

¶ Dicunt Sapientes causam diuersitatis esse, quia Hepatis Apostema est magis sanguinis attractivum, q̄ Pleuræ, aut quia non sit tanta distantia in phlebotomando ex opposito in costali morbo, quāta esset in Hepatis Apostemate, si ex opposito fieret venæ incisio.

¶ His te opponis dicēs, qđ in pleuritide sit maior dolor, & locus etiam pectoris satis calidus plus attrahit, Stet etiā (inquis tu) qđ Apostema Pleuræ magnū sit, Hepatis autē parvū, & ita vehementius trahetur materia i pleuritide, q̄ ad Hepar, Secūda ratio diuersitatis a te destruitur hoc pacto, In eadē distācia videtur esse Hepar, & costæ mēdosæ, cū sint immediate, & se inuicē contingant, Et sic ratio diuersitatis a Sapientibus assignata, quæ duplex erat, nullo stabili fundamento erigitur. Hæc aut ratio adeo turbauit Auerroē, ut coactus fuerit. vii. colliget dicere Galenū sibi contradixisse, In sermonibus. n. uniuersalibus saliet. iii. artis parue videtur uoluisse phlebotomiam debere fieri ex latere opposito, Sed. xiii. Therapeutica ex eodem.

¶ Nicolaus Florentinus hanc contradictionē sedauit, Ex cuius solutio ne manifeste apparebit contrariū eius, qđ ipse, & Cōsiliator dixerant in reddenda causā diuersitatis. Dixit. n. sermone. iiii. tractatu. ii. capite. xxii. sub rub. de Apostematibus membrorū interiorū in generali, & præcipue de Apostematibus membrorū anhelitus, & tu scis, qđ i Apostematis euacuatione duæ res attenduntur, Vna est euacuatio membrorū cū ipso cōmunicantiū, & alia est, ut fiat declinatio humorū ad partem contrariā, sicut facit natura, quādo criticat Apostema Hepatis per fluxū sanguinis ex nare dextra, eo qđ ista euacuatio continet oppositionē, & cōmunicationē, Sed in phlebotomia Basilicæ in Apostematibus Hepatis nō est nisi una intētio propterea, qđ est in dimensione corporis quæ secundū latitudinē existit, Hepar ergo cū sit in una extremi tate dimensionis latitudinis, necesse est ut phlebotomia fiat per aliam partē, scilicet per Basilicā sinistri lateris, quia in ea continetur cōmunicatio, & oppositio, & quando nos intendimus facere euacuationem continentē cōmunicationem, & oppositionē, tunc inuātiū est plerūq; trahere materiā, q̄ quando unā intendimus. Solū ergo, cū fuerit necesse totū corpus euacuare, propter huius necessitatem necesse est ambas habere intentiones, Sed, si nobis suffiat unū solū membrū euacuare, tunc una sola suffiat intentio, ideo in maiori parte, quādo i talibus locis fuerit Apostema, & unā solā intentionem habuerimus, faciemus attractiōnem remouentem sine euacuatione, & tunc fieri poterit, quādo membrum

brum euacuatione indiget, & nō totū corpus, & pōt a'iqñ esse, ut pri-
ma intētio sit sufficiēs in aliquo loco, & tūc sit solū i tēpore status Apo-
stematis, sicut minutio ex uenis in Synanche facta, Nā, si possumus mē-
brū propriū pblebotomare, uel euacuare, cōueniēs esset, eo qđ nō sit ti-
mēdus materiæ cursus, Hæc Nicolaus. Sed in capite de Apostemate Hes-
patis adducit Plateariū dicētē, qđ pblebotomia i principio huius Apo-
stematis fiat de latere sinistro, Et subdit Nicolaus, In hoc autē cōsiderā-
dū est in canonibus uniuersalibus datis de pblebotomia, Nā stāte pleni-
tudine sanguinis multa, ut frequēter ab authoribus accipitur, pblebo-
tomandū est de uena longinqua, ut de Basilica sinistra, uel de nigra,
uel de omnibus Saphenis, & deinde perueniendū est ad pblebotomiā
de Basilica dextra, Hæc Nicolaus.

¶ Ex his autē, quæ hic uir sapientissimus scripsit, facile colligi pōt cōis-
oium practificantū opinio, & qđ ea sit Galeni, & Hippocratis pæptis
cōsona, nec etiā Galenū sibi cōtradiere, ut illi pperā Auerroes iponit
Manifeste. n. dicit, qđ corpore existēte pleno, pblebotomāda est uena
ex opposito latere dextro, uel sinistro, corpore autē non existēte pleno,
nō cōuenit pblebotomia ex latere opposito, sed solū ex mēbro patiēte,
& subdit, qđ mēbrū patiēs incidi debet, & pblebotomari tpe status, in
quo nō est timēdū de cursu materiæ, In principio uero possunt in opposi-
ta parte fieri diuersiones cū ligaturis, uētosīs, & hmōi. Sed uideo te iā
in capū descendere asserētē, qđ, cū pleuritici morbi cōiter eueniētes non
sint cū plenitudine sanguinis, nō erit faciēda pblebotomia ex latere op-
posito in pluribus harū ægritudinū, qđ tñ cōis schola practiciatū usui
mādat, Rasis. n. cū scripsit pblebotomādū esse ex latere eodē, sermonē
fecisse uidetur in his morbis, q ut plurimū, & cōiter eueniūt.

¶ Respōdebo hoc (inquā) nō admitti, qđ plurimæ Pleuritidis ægritudi-
nes ueniāt, & cōtingāt, corpore nō existēte pleno, & ppter hoc i Pleu-
ritide fieri debeat pblebotomia ex eodē latere. Sed hoc ingenue fateor,
qđ, siue ægritudines pleuritice sint, quæ ut plurimū eueniūt aut sine
plenitudine, ut inquis, aut cū plenitudine, semp uerū est, qđ tuis scri-
ptis mādaſti, pblebotomiā fieri debere ex eodē latere derivatiuam, &
euacuatīuā, Hoc. n. ad uerificādū dicta Rasis, & cōformē faciēdū Ras-
is cū Principe, eius uerbis addidisti. Sed dic (quæso) mi Curti, Si id ue-
rū est, qđ asseris, uidelicet qđ plurimæ ægritudines costales eueniāt si-
ne corporis plenitudine adeo, qđ nulla cōpetit p mēbrū oppositū diuer-
sio p pblebotomiā, sed tñ mēbri laci euacuatio, cur hāc uene inuersionē

DE INCISIONE VENAE IN PLEVRITIDE

nō facis tpe status, & qñ fluxio restitit, Si. n. nullus est timor de cursu materiae, cum corpus nō sit plēnū, & p ligaturas, & uentosas possimus occurrere, cur pāpis pblebotomiā hāc, quā deriuatiuā uocas, siue curatiuā, fieri debere in principio, cum nec Hippocrates, nec Galenus, nec ratio differt illam posse fieri nisi tempore status?

¶ Ex his itaq; Nicolai dictis apparebit solutio ambiguitatis Auctoris in sermonibus Galeni, Dicit. n. Nicolaus, qđ cū Gal. i sermonibus uniuersalibus, uidelicet. iiii. artis parue dixit, diuersionē fieri ad cōtrariū, uerū dixit, Cū uero. xiii. Therapētica iussit i A postematibus Hepates pblebotomiā fieri in latere dextro, nō de diuersina, sed de deriuatiua intellexit. Qđ aut diuersina pblebotomiā fiat ad cōtrariū, & deriuatiua ex eodē, nullā cōtrarietate in se claudt. Idē est dicendū in A postematibus Splenis, qđ pblebotomāda est Basilica sinistri lateris, intelligēdo de euacuatione deriuatiua, & nō de diuersina. Iste est modus saluādi cōtradictionē apparentē in dictis Galeni secūdū Nicolaū. Ego uero libētissime a te itelligerē, quomō hāc soluis ambiguitatē, nisi uelis dictū Galeni in sermonibus uniuersalibus intelligi, ubi sola intenditur, diuersio tūc fit ad cōtrariū, Sed in huiusmodi A postemate Hepatis intēditur & diuersio, & euacuatio, hunc. n. modū uideris inferius asserere.

¶ Sed, quē sit in hac ambiguitate opinio mea, facile dicā, pmissa prius corporis humani diuisione, qđ posuit Nicolaus sermone. vii. tractatu. v. capite. xii. sub rubrica de his, quē implent recursuni, & extractu.

¶ Dixit. n. qđ Homo diuiditur secūdū lōgitudinē, p quā est oppositio secūdū inferius, & supius, scđo diuiditur scđm latitudinē, scđm qđ est oppositio scđm dextrū & sinistrū, tertio diuiditur scđm p sūditatē, scđm qđ est oppositio scđm ante, & retro, Diuiditur etiā humanū corpus i tres regiones, in supremā uidelicet, qđ capitis est superior pars, usq; ad furculā pētoris supiorē, Altera uero, qđ ab hac supiori furculā incipit, & inferiorem pētoris furculā claudit, qđ media regio nuncupatur, Tertia est, quē ab hac inferiori furcula initium sumit, & usq; ad infima pedum tendit, Hāc etiā corporis diuisionē uidetur Gal. cōsentire, quando. iiii. Therapētica capite. vi. dixit, Ventrem aut hoc loco non solum inferiorem intelligendū esse, sed etiā superiorē, patere mihi arbitror, Diuiso nāq; qđ inter collū, & crura est trunco, in duas capacitates maximas, prior sub thorace, secunda sub membrana, quē Abdomini subtrahitur (Peritoneon Graeci uocāt) cōtinetur, hēc Gal. Iccirco oculus, si A postemate laborat, atq; humeralis uena incidatur, dicitur, qđ sit di-

uersio in oppositum, oculo existēte in suprema regiōe, humerali autē uena in media, quæ secundā dimēsiōem longitudinis opponuntur. Si uero, patiēte oculo dextro, phlebotomia fiat in brachio sinistro, hæc uena in infio duplicem continebit oppositionem, eā scilicet, quæ est a superiore ad inferius, & eam, quæ est a dextris ad sinistrum, & hoc est faciē re phlebotomiam in duas diametros, quam nullus Sapientum cōmendat, Sed tam Græcus, quam Arabs damnauit.

¶ Queritur modo, Hepar, & Splen aut cōtinentur in media regione, aut non, Si continentur in media, ut supra uisus est Nicolaus posuisse, respondēdo tuæ rationi dicemus, cōcedendo idē esse indiūm in utroq; & qđ in utroq; morbo & Hepatis, & costæ phlebotomia deriuatiua sit ex eodem latere, & in statu, Venæ autē in infio, q̄ retractiua dicitur, & quæ in principio sit, sit ex latere opposito patienti particule, Si. n. in eadem cōtinētur regione, & in ea nulla alia est oppositio, nisi ea, quæ est dextri ad sinistrum, & ecōtrario (de ea. n. q̄ est ante, & retro, nulla sit modo cōsideratio) & retractio sit in cōtrariam partem, necessario est in utroq; Apostematum genere, qđ phlebotomia retractiua fiat in sinistro, Apostemate existēte in dextro, Si uero Hepar, & Splen non in media continentur regione, sed in infima, tunc dicemus rationē tuā assumere falsum, uidelicet qđ idem sit indiūm in Apostemate Hepatis, & costalis morbi in phlebotomia faciēda, quia phlebotomia retractiua in Hepatis Apostemate, quæ sit in principio, & respectu fluentis humoris, fiet ex Basilica dextri lateris, quæ habet ad Hepar oppositionem per superiorius, & inferius, Sed in Apostemate Pleuræ, cum locus patiens, & uena inidenda sint in media regione, fiet phlebotomia retractiua in latere opposito secundū dextrum, & sinistrum. Vtūq; igitur dicatur, uel qđ Hepar in media regiōe, uel in infima, patet manifeste, uel qđ falsum assumis in tua argumentatione, uel minime cōtra nos cōcludis.

¶ Quid autem senserit Galenus. xiii. Therapeutice, ubi curam particularem ponit Apostematis Hepatis, ingenue dicam, Galenus citato loco proponit casum, uidelicet qđ Iecur iam Phlegmonem contrahere cōperit, & querit, quæ nam sit cūsmodi commodissima curatio, & in assignanda hac commodissima curatione petit, an corpus totum inanitione indigeat, qđ si indigere inuentū sit, alijsq; tū uirtute, tū etate cōsentientibus, iubet fieri debere phlebotomiā ingens, Ergo pariter tū reuellendus, tū educendus, qđ ad Iecur fluit, sanguis est, iterna in dextro cubito infecta uena, In quibus uerbis apparet manifeste euacuationem

DE INCISIONE VENAE IN PLEVRITIDE

scitū esse retractiua, & diuersiua respectu humoris fluētis ad Hepar, q̄ in principio cōueniēs est, & patet ex his q̄ dicta sunt, qđ hęc diuersio ad cōtrariū fit secūdu eā cōtrarietate, qđ est a deorsum in sursum.

¶ Et, si dicatur, qđ etiā sit euacuatiua humoris, q fluxit, cum Galenus etiā hoc asserat, cū dixit, tū reuellēdus, tū educēdus, respōdemus, hoc minime Galenū dixisse, qđ intētio fuerit euacuādi humorē, qui fluxit, immo dixit, qđ tū reuellēdus, tū educendus, q ad Iecur fluit, sanguis, & nō dixit, q ad Iecur fluxit, sanguis, Sed id Galenus adiūxit, q̄a reuulsio, & retractio fieri pōt sine euacuatione p uētosas, frīctiones, ligaturas, & huiusmodi, qđ in corpore nō repleto adimpleri debet, potest etiā & cū euacuatiōe diuersio fieri, quod maxime cōuenit, corpore extēte pleno, ut dicebat supius Nicolaus, Scripsit. n. Galenus. xiii. Therapeutice distinctione. iii. capite. iii. Momētū omne laborāris Plegmonē partis in reducētis in ipsa sanguinis euacuatione cōsistit, & subdit, Vacuatio autē hoc genus affectōrū excogitata est duplex, aut trāsflato ad alias partes, q̄ i egra cōtinebatur, sanguine, aut foris a corpore expulso, & dixit, satius pfecto est utraq; uti, Et ideo dixit, tū reuellēdus, tū educēdus, Hęc igitur phlebotomia, quā p̄cipit Galenus, est diuersiua facta in principio, & respectu humoris fluētis, & est secundū diuersum, & oppositū secundū superius, & inferius.

¶ Et, si diceres, pari passu uidentur incedere Iecur, Pectus, Pulmo, & Cor, dicente hoc idē Galenū, cum dixit, ubi Iecur, Pectus, Pulmo, aut Cor sic afficiūtur, internā incedere, respōdemus Galenū loco dicto uelle Iecur, Pectus, Pulmonē, & Cor simili modo incedere quātū ad uenam phlebotomādā, q̄a semp uena ea ināditur in eorū egritudinibus, quę interna dicitur, nec i eo loco determinauit quā internā uenā, dextrā, an sinistrā, licet in Apostemate Hepatis ad diuertēdū declarauerit eā, quę in brachio dextro, Nec licet arguerē, ergo in egritudinibus aliorū dictōrū mēbrorū phlebotomāda est interna dextra, nec hoc dixit Gale. Iecirco, si diuersionē intēdimus, faciēda est phlebotomia ad contrariū, ut i Apostemate Hepatis Galenus fecit, Si uero intēdimus deriuatiuā, fiat ex eodē, & secūdu rectitudinē patiētis particule, ut docuit Gal. ii. de arte curatiua ad Glauconē. Patet itaq; respōsio tuę argumētatiōi, qđ nō est idē iudiū de Apostemate Hepatis, & Pleure, cū Hepar sit in infima regione, & Pleura in media, Et licet i oībus talibus egritudinibus phlebotometur Basilica, nō tamē semp, & in oībus eadē Basilica dextra, aut sinistra, Et maiore, & p̄p̄inquire societatē habēt uenę nutritiēs

nutriētes costas mēdofas cū Baſilica, q̄ uena Cœle in ortu ſuo in Hepa
 te cū illa, Cū hoc etiā, qđ uenę nutriētes costas inferiores cōtinuātur
 cū uenis nutriētibus partē peſtoris ſuperiorē, quę in truncum Baſilicę
 mittit, Et ideo non eſt idē iudiciū. Et patet ſolutio apparētis contradi
 ctionis in diſtis Galeni, hic enim in. xiii. Therapeutica diuerſionē fa
 cit ad cōtrarium, et non ſolum erat in eodem latere, quod nullo modo
 contrarietatem haberet ad particulam patientem. Nunc tempus eſt ad
 ſecundam rationem accedere, quę talis eſt.

¶ Apud oēs, qñ materia fluxerit, cōuenit pblebotomia eiſdem lateris
 in principio pleuritidis, licet materia nō fluxerit ad A poſtema, fluxit ta
 men pro magna parte ad latus A poſtematis, et loca circūſtantia ad
 A poſtema, ut patet ex modo generationis Pblegmones poſito a Gal. in
 textu de tumoribus præter naturā in principio, Et in de mala cōplexio
 ne diuerſa in principio, et. iii. Technes. clv. Igitur in principio pleuriti
 dis cōuenit pblebotomia eiſdē lateris, Idē debet eſſe iudiciū de mate
 ria, quę fluxit ad A poſtema, et q̄ fluxit ad loca circūſtantia ad A po
 ſtema, Vult. n. Gal. in his locis, qđ, qñ materia ſluit ad faciendū Pbleg
 monē in aliqua determinata parte, prius repleātur uenę, et Arterię
 minores ita, ut quę ſenſum latebāt ſui paruitate, nūc appareant, et
 poſt modū, quādo nō poterunt plus cōtinere, exeant humores ad poro
 ſitates mēbrorū, ut faciāt A poſtema. Dicitur (inquis tu) ad hęc rōnem
 fortaſſis, qđ, licet materia pro parte fluxerit ad loca circūſtantia A po
 ſtemati, alia tñ adhuc ſluit, quę diuertenda eſt. Sed cōtra, uenę circū
 ſtantes A poſtemati ſunt adeo plene, ut plus cōtinere non poſſint, Ergo
 maius periculū eſt de materia ibidē exiſtente, ne augeat A poſtema, q̄
 de materia, q̄ ſluit de nouo, Ergo ſaltē nō ſolū eſt faciēda euacuatio, q̄
 diuertat, ſed etiā, quę euacuet a loco leſo, immo (ut uult Galenus in
 ii. re. acutorū textu. x.) quę plus euacuet a loco leſo, q̄ ab alijs ptibus,
 Talis aut eſt Pblebotomia eiſdē lateris, nō lateris oppoſiti. Hęc ſunt,
 quę in tui ſanore adducās pro ſecunda ratione.

¶ Multa in hac ratione tua ſapiētiffime ſcribis, ſed audeas, quę pro re
 ſponſione adducantur, Cōcedimus. n. in principio A poſtematis p parte
 humorē fluxiſſe, et pro maiori parte fluxurū eſſe ad loca circūſtātia
 A poſtemati, et qđ periculū eſt de materia ibidem exiſtēte, ne augeat
 A poſtema, Et, cū tu inferis, ergo ipſa eſt euacuanda, nego cōſequentiā,
 Cōcedo tñ, qđ ad euitandū periculū augmēti, quod ſequi poſſet, trāſ
 miſſa hac materia a uenis in poroſitates mēbrorū ſufficit, qđ fiat ab

DE INCISIONE VENAE IN PLEVRITIDE

euacuatio, uidelicet qđ ab illis locis A postemati ppinquis attrahatur
 ad loca alia, & cōtraria particula patiētis, p qđ attractionē inhibetur,
 ne hmoi humor augeat A postema, Hec aut humoris attractio ibidem
 circūstātis A postemati fit p euacuationē sanguinis i pte cōtraria, Dice
 bat. n. Galenus. ii. re acu. textu. x. qđ, si nō inueniatur Basilica, & ap
 pareat uena nigra, inidatur nigra, hac uero nō apparēte, & manife
 sta existēte uena Cephalica, ipsa inidatur post, qđ scis, qđ euacuatio, ex
 qbuscūq; locis fiat, attrahit ex toto aīalis corpe, hēc Galenus, Et p hoc
 idē apparet, qđ euacuatio illius humoris circūstātis A postemati i uenis
 uianis p ināsiōne uene eiusdē lateris in pncipio, qñ humor fluit, nō est
 cōueniens, nā tūc maius esset nocumentū, qđ fieret i attrahendo ex to
 to corpe ad pte illā, q inuamētū euacuationis illius humoris, facilius. n.
 trahitur sanguis p uenā Caelen a toto corpe, q humores in paruis uenis
 suppressi, atq; cōculcati in uenā ipsam, Sed, si ināsiō uene fiat ex latere
 opposito, uacuatur pars illa, & ad ipsam euacuatā trahitur nī uacuū
 humor ille cōrētus in minutis uenulis ad eadē partē, & sic abeuacua
 mus, Quo pāsto ope, patet nō esse piculū, ut A postema augeatur, qñ
 eo nō inhibitiō fiat, Rō igitur tua nulla est, cū ex eo, qđ ponitur nō se
 quatur de necessitate faciendā esse uacuationē illius humoris ab extra p
 uene ināsiōne. Sed uel hoc faciendū, uel abeuacuatū. Tercio sic istas.
 ¶ Natura nūq̃ bene euacuat, nisi ex eodē latere, & ars debet imitari
 naturā recte opantē, igitur. Prima ppositio habetur i tex. de Phlebotom
 ia a Gal. doctrina. ii. summa. ii. cap. i. & .iii. de Crisi cap. iiii. & i. ii.
 tracta. de febribus ad Glauconē. Forte dicitur, qđ euacuatio, q recte fit
 a natura, est euacuatio, q fit post digestionē in fine & gritudinū, & nos
 loquimur de euacuationē factā i pncipio ante digestionē, & q est euacua
 tio diuersiua, Sed istud nihil est, rō. n. quare in fine & gritudinū digesta
 materia, natura nūq̃ recte euacuat, nisi ex eadē pte, est, qā illa materia
 cōuenientius & facilius euacuatur ex eadē parte, q ex alia parte oppo
 sita, Immo, si fiat euacuatio ex parte opposita, non euacuatur tūc ma
 teria peccans, & propterea est mala euacuatio, Cū igitur in principio
 Pleuritidis nō solum sit intentio nostra diuertere, sed etiā euacuare, &
 euacuatio longe facilius fiat ex eadem parte, q ex opposita parte, erit
 Phlebotomia ex eodem latere facienda, & maxime cum Phlebotomia
 eiusdem lateris plus diuertat, q lateris oppositi.

¶ Hec tua rō uir clarissime nō claudit ostiū, Cur. n. phibuit Hippo. in
 Pleuritico morbo descendēte ad Hypocōdria dari Pharmacū i pncipio,
 si intentio

si intentio in tali morbo descēdēte est & diuersio, & euacuatio in ipso principio: Et, cū tu asseris, Natura nūq̃ bene euacuat, nisi ex eodē latere, hoc qdē intelligendū est, qñ natura itendit euacuationē, Si igitur artifex i opando in pñcipio Pleuritidis intenderet euacuationē p Pblebotomia, pfecto ex eodē latere uenā ināderet, Sed in Pleuritide in pñcipio itenditur sola diuersio, Licet. n. i A postemate gñando p modū fluentis humoris tota intentio sit duplex. s. retrahere fluentē humorē, & de rinare eū, q fluxit, nō tñ hæc duplex itentio in uno morbi tpe executio ni mādatur, Sed in hmōi morbi tpe, qđ principiū nomināt, fluentē humorē retrahit, In statu uero deriuat eū, q fluxit, ut in. iiii. de ingenio sanitatis cap. vi. supra diximus Galenū scriptis mādasse ex Hippo. placitis. Qđ aut dictū est, qđ uenae ināsis in eodē latere plus diuertat, q ea, quæ in opposito sit, in modo dicēda ratione diluādabimus.

¶ Quarto in subsidū tuæ opinionis adducimur ratio ista, illa Pblebotomia est faciēda in Pleuritide in principio, q plus diuertit, sed Pblebotomia cuiusdē lateris plus diuertit, q pblebotomia lateris oppositi, Ergo &c. Probatū minor, qñ. n. ex fonte magno fluūt riuuli a dextris, & si nistris, si uis, qđ riuuli a dextris resluāt ad fontē, oportet euacuare fontē magnū a parte dextra & nō a sinistra, & ecōtrario, Igitur, cum uena Cæle sit, sicut magnus fons, unde uenæ paruæ oriuntur, q sanguinē deferūt ad costas, si uolumus facere, qđ i Pleuritide dextri lateris uenae dextri lateris resluant ad fontē, oportebit uacuare uenā Cælen ex parte dextra, & ex cōsequēti ex Basilica dextri lateris erit faciēda Pblebotomia, & ita in Pleuritide sinistri lateris ex Basilica sinistra.

¶ Hanc tuā rationē mi Curti fateor me non intelligere, & mihi nō fieri uerisimile, quod si uolūero diuerrere, plus hoc faciā ex eodē latere, q ex opposito, Et omnibus manifestū esset Galenū somniasse, cum dixit, Retractionē fluentis humoris debere fieri ad contrariū, quin etiam, cū dixit, ad longissimam partē, tūc magis delirasse, & maxime, si faciliior, & melior sit retractio ad propinquam, quam ad longinquam, Sed cōcedatur & tibi, diuersionem copiosioreni fieri ex eodem, quā ex opposito latere, nō tamen, qđ inferitur, necessario sequitur, Respōdebo. n. cōcesso illo, nō tñ debet fieri retractio ex eodē, qā plus affert nocimenti in attrahendo ex toto corpore, q inuamenti in euacuando humorē cūcū statim A postemate, Per attractionem. n. ex toto p ipsum truncū sit partīs illius repletio, quā repleta existente nō possunt humores existentes i uenis costas nutrentes ad fontē resluere, ut bene, & optime asseruisti.

DE INCISIONE VENAE IN PLEVRITIDE

Sed facta uenae incisione in opposita parte, uacuatur humor illius partis, ad quam euacuatione sequitur humoris alterius partis motus ad illam. At manifestum est, quod per huiusmodi uenae incisionem non transmittitur ad partem oppositam humor, sed potius, qui in ea est, attrahitur, et fluens ad ipsam retrahitur. Non dico, quod humor existens in parte laesa euacuatur, quammodum moderata sit euacuatio, sed ab euacuatur. In hac igitur uenae incisione. scilicet in parte opposita, si fiat in principio, erit inuacuetum sine nocumeto, et ideo haec in principio potius eligenda est, quam alia eiusdem lateris, in qua plus est nocumeti, quam inuacueti, et sic patet solutio argumenti.

¶ Quintam deinde rationem adducis, ut magis firma, constetque sit opinio tua, ea haec est, ubi materia fluat ex parte capitis dextra, redeatque in uenam Caelen, et fluat ad partem dextram pectoris, constat, quod longe melius diuertit Phlebotomia lateris dextri, quam sinistri. Immo Phlebotomia lateris sinistri nihil fere diuertit. Fluente. n. materia per uenam Caelen magnam, per partem dextram deorsum, constat per eandem partem debere retrahi sursum, quod, nisi per Phlebotomiam eiusdem lateris, fieri non poterit, et similiter, si fluat a deorsum in sursum per partem dextram uenae Caeles (constat quod, si trahatur sursum per eandem partem dextram) impediretur, ne a uena Caeles uadat ad ramulos paruos tendentes ad partem dextram pectoris, ubi est Apostema. Nec potest fluere materia a parte sinistra pectoris ad dextram, nisi redierit in uenam Caelen, quod raro ualde contingere potest, cum fortior sit uirtus uenae Caeles magnae, quam uenarum paruarum et uenae fortes mittant ad debiles. Praeterea, statu plenitudine in parte sinistra, potius deberet fieri Pleuritis in illa parte, quam quod ex illa parte fluat materia ad partem dextram.

¶ Pulcherrime (inquam) ac subtilissime argumentaris, facillime tamen, et clare respondebo, si materia, et humor, qui a parte capitis dextra sub ingressus uenam Caelen fluxit in partem pectoris dextram, retrahendus esset sursum per eandem uiam, profecto existimare uenae Cephalicae, et non Basilicae incisionem, uel alterius superioris uenae attracturam humorem illum ad superiora, et maxime eam uenae incisionem, quae secundum refectionem partis patientis fieret, quia, ut superius dixi secundum Galeni sententiam, euacuatio facta in aliqua parte corporis attrahit a quacunque eius parte, Et ideo concessit Galenus eodem citato loco, quod, non inuenta Basilica, aut nigra, fieret ex Cephalica uena incisio, Sed intentio medentis Medici non est, ut materia resfluat ad locum, a quo coepit fluere, sed ut fluat, et diuertatur ad partem contrariam particulae patientis. Vbiq; asserit Galenus, quod particula patientis docet nos, unde, id est ex qua parte, et quomodo

id est

id est p quā uenā fieri debeat sanguinis missio, uel humoris retractio, quæ ad contrariā partē loci dolentis fit, & nō dixit, humoris retractio nem fieri debere ad eū locū, a quo fluere cæpit, Si. n. locus patiens sit dexter, & fluens humor, ad sinistrū diuertatur, seruatur, ueritas orationis dicētis. Retractio fit ad cōtrariū, Et, cū facilius sit huiusmodi humorē fluentē a parte capitis dextra in dextrū pectoris retrahere in sinistrū, q̄ in sursum ad eū locū, a quo cæpit fluere, huius uenæ ināsisio in sinistro conuenientior erit, & facilior, & expedita magis.

¶ Sexta subsequitur ratio, quæ ortū habet ab eo, qđ Galenus usui mā dauit, & inquis, Si materia fluit a parte capitis dextra ad sinistrā ad faciendū dolorem, uel A postema, Phlebotomia facta in Basilica sinistra æque, & magis trahit materiā ad locū, sicut Phlebotomia in Pleuritis de ex eodē latere, est tamē faciēda de mēte Galeni ad Glauconē capite. viii. & proprie secundum traduccionē Leoniciāni.

¶ Huic respōdemus negantes, & interimētes, in dolore capitis sinistro, aut in A postemate i eodē loco existēte, Basilicæ sinistræ ināsisionē æquæ & magis trahere materiā ad locū dolentē, sicut Phlebotomiā in Pleuritide ex eodē latere, Nā in Pleuritide lateris dextri, si fiat Phlebotomia Basilicæ dextræ, inter locū patientē, & uenā ināsam nulla cadit contrarietas, Sed in A postemate sinistri lateris capitis si fiat uenæ Cephalicæ sinistræ ināsisio, licet huiusmodi uacuatio trahat ad sinistrā partem, tamen non trahit ad dolentē locum, sed ad sinistrū inferius, Et iccirco Phlebotomia conāssa in tali A postemate a Galeno fuit reſta, & conueniens, quia nō trahit ad locū lesum, sed ad sinistrū inferius, & hæc optime diuertit, cū sit secundū reſtitudinē partis patientis, Ea uero, quæ in pleuritide, ad locū trahit dolentem, nulla ibi existente contrarietate inter locum dolentem, & uenam ināsam.

¶ Septima ratio inducitur hoc modo, Vnde cunq; natura repit, inde du ære oportet, per conueniētes regiones, In Pleuritide dextri lateris natura repit ad dextrā partē, Igitur per illā fieri debet Phlebotomia. Forte dicitur (inquistu) qđ sententia illa Hippocratis intelligitur de euacuatione, quæ fieri solet, quādo materia iam fluxit, quā natura tentat euacuare, & nō de diuersione, Immo uidetur repugnare, qđ fieret diuersio, quæ est retractio ad contrariū, & euacuare per locū, unde natura repit, Si. n. natura in prināpio A postematis repit ad aliquod mēbrum, trahendū est ad contrariū. Illud autē stare non potest, quia Galenus, ii, re, acm, cōmento. x. uerificat illā sententiā etiā in diuersione, nec

DE INCISIONE VENAE IN PLEVRITIDE

repugnat fieri diuersionē, & euacuationē secundū illā partē, secundū quā natura repit, Stante. n. pleuritide in dextro latere, peccās materia potest a loco lēso diuertere, aut trabendo eā superius, aut inferius, Et iō dicebat Hippocrates, quādo dolor ascēdit ad furculas, facias Pbleboto/ miā Basilicā, quia tunc natura uidetur mouere materiam superius, Si autē dolor descendit, exhibeatur pharmacia, & trahatur materia infe rius, sicut natura repit. Et ita in his casibus fit diuersio materiæ a loco lēso, & secundū eandē partē, secundū quā natura repit. Hæc n.

¶ Galenus in cōmēto Aphorismorū, undecūq; natura repit, p̄cipit in hunc modū, oportet medicū naturæ motū animaduvertere, & si quidē idoneus fuerit, ei cōuenit auxiliari, Si uero cōtrarius, incōmodus, atq; noxius, hunc prohibere, trāsferre, atq; diuertere, & auocare oportet, Quis est mi Curti, q motū humoris ad loca costarū, & Pleuræ factu/ rū A postema, & morbū, iudicet hūc cōmodū; & apte & cōdecēter na turā hūc motū facere, cui opitulari, anallari, adininiolariq; oporteat? profecto prouidus, ac sapiens medicus hunc motū potius cohibebit, & trāsferret, & in aliā partē humorē illū auocabit. Nō igitur natura na turaliter operatur, quādo hunc mouet humorē ad A postema genera/ dū, cui medicus auxiliari debeat. Nō debet itaq; prudēs medicus, & q futura mala præcauere debet, in principio costalis morbi p illā partem euacuare, ad quā natura a morbo stimulatā, humorē illū declinat, qā ut dixit Galenus in libro de arte curatiua, Si ad locū, & particulā pa tientē humorē fuentē traxeris, malū geminabis, Sed, si morbus in sta tu fuerit, in quo totus humor fluxit, tunc ratio cogit, ut euacuetur, de riuetur, & deducatur, & ex ea parte, ad quā humor inclinauit, qā fa cilius, & expeditius hoc fiet, In principio uero medicus cohibebit mo tū illū, & in oppositā partē traducet humorē, hoc autē p euacuationē factā p eādē partē minime fit, nunquā. n. inuētus est Galenus, q retra ffionē mandauerit debere fieri per eandē, sed diuersam partē.

¶ Cū uero ulterius asseris nō repugnare, p eandē partē fieri diuersio/ nē, & euacuationē, Respondemus, id uerū esse, & opere naturæ com probatū recte id operantis, quæ quādoq; Hepatis A postema per fluxū sanguinis nariū indicat, Et, si p dextrā partē indiūū faciat, cōmode, & expedite facit, Sed, si per sinistrā narē indicat, incōmode, & cū iactura indicationē facit, ut asserit Hippocratis decretū, Sed, licet talis naturæ motus sit simul diuersio, & euacuatio, & per unā, & eandē partē. s. dextrā, tamen in tali motu est cōtrarietas, quæ est deorsum in sursum, ut per

ut per hoc ratio diuersionis saluetur, quæ est in cōtrarium mouere, Is aut naturæ motus p eadem partē dextrā cōmendatur, quia est secundum reſtitudinē patiētis partiæ, & (ut iuniores referūt) est diuerſio secundū unam diametrū, Motū autē, qui fit secundū ſiniſtrā narem, Galenus infamat, & carpit libro de Phlebotomia ſumma. ii. capite. iiii. dicens, qđ nihil inuat, & nocet quādoq; in diſſoluēdo uirtutem, abſq; qđ paſſionē leuet, & hoc ideo, qđ nō est secundū reſtitudinē patientis loci, uel (ut recentiores) est retractio secundum duas diametros, Sed in Costali morbo, ipſo exiſtēte in dextra parte, ſi fiat ſanguinis miſſio in Baſilica dextra, nulla fit diuerſio, nec ea, quæ ab inferius ad ſuperius. cum partiæ patiens, & locus, per quē fit Phlebotomia in eadē ſit media regiōe, nec est etiā cōtrarietas iter dextrū, & ſiniſtrū, cū oppoſitū, caſus ipſe depoſuerit, Nec nūbi nūc est curæ, ſiue aſcendat, ſiue deſcēdat dolor, ſemp. n. ſunt in eadem regione media, & in dextris. Quod uero adducis, Hippocratem ſic uſui mādaſſe, & p eadem partem, ad q humor inclinatur, ſc̄erit euacuationem, ut aſcendente dolore, p Phlebotomiā, deſcendente uero, p Pharnacum, hoc facile cōcedimus aſſerentes id Hippocrati mādaſſe fieri tpe ſtatus, & nō in principio, ut p̄diximus, Et, cum Phlebotomiā p̄cipit, diximus id fuiſſe tempore ſtatus, in quo qdem tpe intentio est euacuādi, & p̄fecto ſanilius, & magis expedite p eadem partem, ad quā humor inclinauit, ſit euacuatio, In principio uero est diuertēdi propoſitum, quod per diuerſum, & oppoſitum adimpletur. Hæc ſunt, quæ Hippocratis, & Galeni placitis ſunt cōformia & conuenientia.

¶ Vltimo in aciem adducis, in Pleuritide magis intendimus euacuationem a loco leſo, q̄ ab alijs partibus, ut clare dixit Gal. ii. re. acu. i cōm. x. qđ & rōne p̄batur, qđ maxima intentio est ad prohibendū augmētū A poſtematis, cuius cauſa est maximus dolor, dolor aut nō remouetur niſi eduſto ſanguine, qui est in loco leſo, q & calefaciendo, & excitando dolorem ſancit, Phlebotomia oppoſiti lateris non plus euacuat a loco leſo, q̄ ab alijs partibus, ergo illa non est faciēda.

¶ Reſpōdemus dicētes iterimendo, qđ i principio A poſtematū, & pleuritici morbi magis intendamus euacuare a loco leſo, q̄ ab alijs partibus, imo nulla est intentio in tali tpe uacuādi a loco leſo humorem, q fluat, ſed retrahēdi ad cōtrariū locū partiæ patiēti humorē ipſum, q fluens est, ne uel a calore, aut dolore in pte leſa exiſtente trabatur ad ipſam, uel etiā ab alijs particulis incōmode ad ipſum patientem locum

DE INCISIONE VENAE IN PLEVRITIDE

trāsmittatur, p qđ opus a Medico inbibetur A postematis augmētum, nec Galenus id fieri mādauit in prināpio A postematū. s. euacuatiōē a loco lēso. Rationi etiā, quā adducis, faile est respondere, Cōcedo. n. qđ in prināpio A postematū maxime intēdimus inbibere, ne A postema augeatur, & cū dicitur, qđ talis augmēti causa est dolor maximus patientis partis, dicimus, in principio dolorē nō esse maximū, sed in statu & qđ nō solus dolor est causa augmēti A postematis, q in prināpio parvus est, sed causa est in alia, alijsue particulis a patiente loco, quae trāsmittunt id, qđ eis qualitate, aut quātitate est superflūū, ad particulā patientē, dolorēq; ibi excitant, Virtus autē excretoria, cū aliquid sentit, quod eā cōtristat, id pūcere pperat. Cū autē suis primis conatibus nihil profecerit, uehemētius aggressa, qđ infestat, expellere, sanguinis aliquid, & spiritus ex suppositis particulis in afflicta sedē, & partē si mul exprimit, ut Gale. xiii. Therapeutica scriptis reliquit, Cū autem natura sanguine, & spiritu, ut instrumentis utatur, & hēc ad patientē particulā trāsmittat, ut his naturalibus eius instrumētis causam doloris a loco remoneat, locus hoc sanguine, & spiritus fluētibus replentur magis, maiorq; sit cōtinuitatis solutio, maiorq; caliditas, unde & maior excitatur dolor, Sapiēs itaq; & prudēs medicus in hoc principiū tēpore maxime pvidebit, ne natura inuitata a morbo in illū locū sanguinē, & spiritū trāsmittat, qđ faile erit, inbibēdo hūc humoris motū p mortū illius ad particulā patiētis loco oppositā. Hoc autē medicus cōsequetur, si Pblebotomiā fecerit in loco opposito patiētis partis, ad quā sequetur humoris fluētis retractio, & eius, q fluxit, abeuacuatio. Nō fiet autē cōmode, si in eadē parte uenae ināsonē fecerit, quae plus nocenti affert in attrahendo ad eā ex toto corpore, q inuamenti in euacuando humores in locis A postemati circumstantibus existentes. Quod uero de dolore fuit insertū, diximus in principio, ipsum paucū esse, & qđ trahit, paucū est. Quod si in augmēto morbus esset, aut in prināpio status, in quibus morbi tēporibus necessariū esset pblebotomare, quia prius ob aliquā causam A eger minime pblebotomatus fuit, & tunc tēporis dolor infestaret nimis, necessariū pfecto esset uti pcepto Prināpis, cū dixit, Cūq; ad diuersum trahere uolueris, dolorē prius seda, nisi fēdetur dolor, cū trahat ad partē patiētē, oppugnaret attractiōi, quae p pblebotomiā fieret in parte opposita, & diuersa, mitigatio autē doloris fit per ea auxilia, quae extra sunt applicata dolenti loco, Remotio autē illius doloris in totū fieri nō potest, nisi pblebotomia, & spūto, ut recte

recte sentis, quæ si in latere opposito fiat, licet humorẽ existentẽ in locis A postemati propinquis nõ euacuet, eũ tamẽ abeuacuat, ut non sit amplius timor cursus materiæ ab illis locis ad ipsũ locũ A postemate affectũ. Ea uero inãfio uenæ, q̃ ex eadẽ sit parte, plus nocet in attrahẽdo a toto corpore ad partẽ leſam, q̃ inuuet in euacuãdo humorẽ illã existentem in uenulis nutrientibus pectus, de quo timor est, ne augeat A postema. ¶ Veniamus modo ad id, quod ultimo loco executus es, & consideremus an ea, quæ tibi obieciſti, ſint ad unguẽ ſoluta, an uero adhuc nodi, quibus te ipſum ligasti, ſint inexplicati, In quis. n. contra te eſſe id, qđ Galenus i tractatu de Antiſpaſi, & in. v. de Ingenio capite. iiii. aſſerit, uidelicet qđ, qñ materia ſluit ad dextrã, debet trahi ad ſiniſtrã, & ecõtrario, Sicut. n. ſit diuerſio de ſuſum in deorſum, ante, retro, intus, extra, ita ſit de dextro in ſiniſtrũ, & ecõtrario, & inquis, qđ hoc argumentũ colligitur ab Auerroc. vii. colliget, capite. xxix. ubi dicit, i libro de ingenio Galenũ dicere uerũ, & ſibi cõtradicere i rationibus uniuersalibus, In libro. n. Therapeuticæ dicit, in Pleuritide eſſe faciendã pblebotomiam eiũdem lateris, & in rationibus uniuersalibus dicit, ſi ſluit ad dextrum, trahatur ad ſiniſtrum.

¶ Huc reſpõdes, qđ quatuor illi modi diuertẽdi ponẽdi ſunt in ſermonibus uniuersalibus, q̃a ad curã oĩum oēs illi modi ſunt neceſſarij, Non tñ uolũt Doctores, qđ in cura cuiuslibet A poſtematis, regrãtur oēs illi modi diuertẽdi, & p̃cipue cũ Pblebotomia, aliter oporteret in cura cuiuscũq; Phlegmones facere tres, aut quatuor Pblebotomias, qđ eſt improbatum, Et ideo in A poſtematibus Hepatis non ſit Pblebotomia ex parte ſiniſtra, & in dolore capitis ex una parte non ſit pblebotomia ex parte oppoſita.

¶ Nõ uidetur mi Curti tua ſolutio nodũ, quo te ligasti, ſolucere, nec ueritatẽ in eo clauſam manifeſtare, Cõcedimus. n. multa eſſe in ſermonibus uniuersalibus dicta de ipsis A poſtematibus, q̃ ipsis cõpetũt, q̃ A poſtemate ſunt, q̃ tñ huic, uel illi minime conueniunt, Et hoc cõtingit aliqua negãte cõditione, Noſti. n. repercuffionẽ humoris, & eiũsdẽ reditũ fuiſſe a Sapiẽtibus cõceſſum i A poſtematibus, qua A poſtemata ſũt, & hoc in ſermonibus uniuersalibus, Cũ autẽ deueniũt ad cõũctorioũ A poſtema, aut ad ea, q̃ a materia uenenofa ortũ bẽnt, Sapiẽtes oēs illius humoris reditũ, & repercuffionẽ negaſſe, uetãte in p̃mo nobili mēbro, ad qđ repercuffio fieret, i ſcđo uero uenenofitate materiæ, q̃ ab itus extra trãſmittatur, minime ei cõceditur ab extra ad itra rediens, Eodẽ

DE INCISIONE VENAE IN PLEVRITIDE

profecto modo differentie ille dextrum, sinistrum, sursum, deorsum, ante, retro, intus, extra licet ponatur in sermonibus uniuersalibus, tñ uti earū aliqua debemus, cū diuersionē facere uolumus, nisi hoc nobis alius qua deneget cōditio a Sapiētibus explicata. Ponamus itaq; nullā esse cōditionē, q̄ diuersionē p̄bebeat fluentis humoris, dic (quæso) nōne humorē illū diuerteret? Et, si diuertere uolueris, non ne uel a dextro in sinistrū, uel ex aliqua illarū oppositionū in alterū diuerteret? Certū est qđ, si ea eni sententiā uolueris esse sempiternæ ueritatis, id obseruare curabis. Cū itaq; in Pleuritico morbo diuersionē esse faciendā cōcedas, & p ueritate, cōcedēda sit, ergo per aliquā illarū oppositionū illā usui mā dabis, nō. n. possumus aggredi retractiōnem facere, nisi seruato dicto Galeni, qđ tanq̄ p̄loquiū cēseri debet. Nec nūc mihi est curæ, quo instrumentō retractio sit faciēda, an. s. uenæ incisione, an cucurbitulis, an ligaturis, an frictiōibus, Sed hoc mihi nūc satis est, qđ, si diuersio faciēda est, per aliquā illarū cōplēda est, Nec dūat ad incōmodū, si in Apostemate, in quo tota intētiō est duplex. s. humoris fluentis retractio, & eius qui fluxit, euacuatio, duabus etiā uenæ incisionibus impleatur.

¶ Cū uero ulterius inferis, Et ideo in Apostemate Hepatis nō fit p̄blebotomia in sinistra, hoc non uidetur ex dictis necessariā habere cōsecutionē, Si. n. quilibet tumor, et Apostema, quatenus Apostema est i principio humoris fluentis retractiōne regit, & Hepatis Apostema est Apostema, Ergo in tertio primæ uidetur necessario sequi, huic, quatenus Apostema est, cōuenire retractiōne, Quod aut ipsi, ut Hepatis Apostema est, non cōpetat, humorē fluentē ad contrariū retrahi, oportet adducatur ratio hoc prohibens, quæ si posita in eo sumpto fuerit, tūc assūptum sub eo acceptū falsum esse manifestabitur, Sed, quæ sit illa, a nullo sapientum inuenio ipsam explicatam, Tua igitur interest illam in medium adducere.

¶ Quod uero ulterius pcedēdo dicis, qđ in dolore capitis ex una parte nō fiat uenæ incisio, et diuersio in altera, Et ob hoc apparet dicta illa in uniuersalibus non semper in usum uenire, cū ad particularia descendimus, Respondemus asserentes id uerum esse, tñ a Sapiētibus fuisse explicatā cōditionē negantē, siue uetantē illud posse fieri, hæc autē cōditio est, ut, si unq̄ diuersio faciēda est, requiratur locorū tāta distātia, quāta est ab humero ad humerū, quāntā distātiā nullus cōcedet in capite a parte dextra in sinistrā, Et ob id Sapiētes dixerunt, qđ decretum Hippo. Aphorif. v. Aphorif. lxyii. posteriora capitis dolētia, in fronte

recta

recta uena icisa, inuat intelligi debet nō de diuersa phlebotomia, sed de deriuatiua distātia parua phibente. Hec sunt quę ad mentē Principis iuniores referūt, Galenus tñ uidetur tuis dictis reluctari in cōmento Aphorif. lxyii. Inquit. n. in doloribus itaq; partis capitis posterioris, cū auersione euacuatio ex frōte fiet, sicut et in anterioribus ea, q̄ secundū occiput, & subdit in usum deuenisse hmoi remediū, dicēs, Sic itaq; diurne oculorū fluxiones sepius sanatę sunt, ex partibus secundū occiput sanguine misso una cū Cucurbitula usu. Hec Galenus, et in libro de Phlebotomia sūma. ii. ca. vii. dixit, Secundū autē eādē rōnem posteriores capitis dolores incipiētes, & iuuenescētes, q̄ in fronte, uena inuat diuisa, Nam Antispases quide simul cū euacuatione fieri oportet magis in incipientibus Rheumaril. us. Hec Galenus, Idem in. xiii. Therapētica. dist. iii. cap. xiiii. dicit. Pręterea Cucurbita in occipite defixa efficax est remedium ad oculorum fluxiones,

¶ Secundā respōsiōnē adiūgis, cū primam nodum soluere nō cognoueris, & dicis, qđ regulę illę uerificātur, qñ intentio nostra est solum diuertere, In Pleuritide autē dictum est, qđ nō solū intēdinus diuertere, sed euacuare, & magis a loco leso, q̄ ab aliis partibus. Hec tu.

¶ Cognouisti pfecto te nō potuisse effugere, quādo in A postemate requiratur diuersio, qñ p aliquā illarū oppositionū fiat. Et qā in Pleuritico morbo cōcedis retractiōnē, ne tibi in tertio primę cōcludatur, in eo fieri debere diuersionē p aliquā illarū, & sic, cū fluat humor ad dextrū retractio fiet ad sinistrū, & econtrario, ideo te uertis ad id, qđ sumptū est, cū dicebatur, In omni A postemate, i quo fit diuersio, p aliquā illarū oppositionū sit, & hoc falsū iudicas, nisi addatur. Solū, sic dicēdo, In oī A postemate, i quo fit sola diuersio, p aliquā illarū oppōnū sit, & tūc sub hoc sumpto, nō licet assumere Costalē morbū A postemū esse, in quo sola regatur diuersio, cū i eo nō solū diuersio, sed ēt eūatio regatur.

¶ Sed mi Curti hō siue solus siue cū Leone sumatur semp i se rōnalitātē includit, Sic & diuersio, siue sola fiat, siue cū ea ēt deriuatio, semp diuersio claudit in se motū ad cōtrariū, Cur. n. Galenus in A postemate oculi dextri, qñ Cephalicā brachii dextri incidit, nūcipat hanc sanguinis missionē, diuersionē, et deriuationē; nisi, quatenus est a superiori ad infra, est diuersio, quatenus autē est ad latus particule patiētis, est deriuatio. Stat igitur dictū Galeni. y. de i genio, et i capite de Antispasi, qđ in oī A pte, aut fluxu materie, in quo regitur diuersio, illa fieri debet p aliquā illarū oppōnū, siue sola fiat, siue cū ea ēt fiat deriuatio.

DE INCISIONE VENAE IN PLEVRITIDE

¶ Tertia tua responsio talis est, Licet concedatur in omni Apostemate cōuenire modum oēm diuertēdi, quia, quocūq; modo diuertatur materia, uidetur cōuenire in phibendo augmentū Apostematis, nō tñ omnis talis diuersio fieri debet cum Phlebotomia oppositæ partis, Potest enim trahi materia a dextro ad sinistrū cū Frictionibus, Ligaturis, Ventosis, non incisa cute in parte sinistra, Immo longe magis trahitur ad partem sinistrā materia sic agēdo, q̄ per Phlebotomiam Basilicæ sinistræ, p̄ quā potius euacuatur pars sinistra, q̄ ad eā trahatur materia, Si enim ualeret hoc argumentum. Materia fluit ad dextrā partē, ergo in principio, cum intēdimus diuertere, est trabenda ad sinistram cum Phlebotomia, Similiter ualeret, ista alia materia fluit ad intus, ergo in principio est trabenda ad extra cum Ventosis, super locū cute incisa, Ita enim ponit Galenus istā regulā, Si fluit ad intus, trahitur ad extra, sicut ponit istā aliā, si fluit ad dextrā, trahitur ad sinistrā, & tamē cōstat, qd̄ Ventosa illa in principio non conuenit. Hæc tu.

¶ Non uideris amplius dubitare, an retractio fiat per cōtrariū, & oppositū, nec, quādo retractio fuerit necessaria, qd̄ per aliquā oppositiōnū fieri debeat, Sed, cū plura sint medicinæ artis instrumenta, quibus retractio fieri possit, uidelicet Phlebotomia. Cucurbitula, Ligatura, Frictio, & huiusmodi, non uidetur tibi, qd̄ Aduersario liceat arguere hoc pacto, in Pleuritico morbo dextri lateris fieri debet diuersio ad sinistrā, ergo in sinistro fieri debet Phlebotomia, quia forte hæc nocumētū inferre posset, Sed Ligaturæ, aut Ventosæ iuuare, Id profecto uerum est quod asseris non esse necessario concludendum, uidelicet in Pleuritico morbo necessaria est diuersio, & in partē oppositā, ergo cū Phlebotomia, Sed, si Medicus in illo uniuersali staret, diuersionē debere fieri per oppositiū, nec sciret, quibus instrumentis esset procedēdū, profecto nunq̄ in opus retractionis descenderet, Icirco Sapientes, ut retractio in opus deueniat, querentes dixerūt, Corpus hoc, quod costalē morbū patitur, aut est plenū, quod pletboricū uocant, aut non, Si plenū, tunc determinauerunt, quod instrumentū, quo facienda est diuersio in oppositū, sit Phlebotomia, huic innitentes rationi, qd̄, si retractio fieri debet & pars, ad quā fit retractio, plena sit, non recipiet, Quod si uenæ fiat incisio in parte sana, ab ea humorem uacuat, & a lesa parte humorē attrahit & abeuacuat, Euacuatio enim, ut supra dictum est, in qua cūq; parte fiat, ab omni particula corporis attrahit. Quod si corpus, quod a morbo Pleuritico molestat, minime plenum sit, Sapientes cō-
nenerunt,

uenerunt, retractionē hāc fieri posse p ligaturas, & huiusmodi in parte opposita, Hęc autē Sapientū decreta tuę aduersantur conclusioni, cū dixisti, Corpore existēte pleno in Pleuritide, fieri debet Phlebotomia in principio ex eodē latere, in quo est lēsiō. Sed, si tu placitis Sapientū minime adheres, declares, quādo cū Phlebotomia, quādo cū alio ingenio sit procedendū in diuersione faciēda ad oppositū. Miror tamen, cū coactus sis cōcedere diuersionē esse faciēdā in Pleuritide, & qđ diuersio fiat ad cōtrariū, cōcedasq; instrumētū diuersionis in hoc esse Phlebotomiā, cur nō obseruas illā fieri in parte cōtraria, dictāte hoc Galenō?

¶ Prosequeris deinde hoc modo, & per hanc respōsionē soluitur aliud argumentū, qđ si non cōuenit in Pleuritide facere Phlebotomiā oppositi lateris, minus conuenit in alijs Apostematibus, ergo nunq̃ faciēda esset Phlebotomia ex opposito latere, nec trahēda materia a dextro ad sinistrū, nec ecōtrario, Dicitur. n. qđ alio modo, ut dictū est, potest fieri diuersio a dextro ad sinistrū, uel ecōtrario, q̃ cū Phlebotomia, uel diuē potest, qđ etiā quādoq; conuenit Phlebotomia ex latere opposito, sicut dicit Galenus in. xiii. Therapēutica dist. ii. ca. v. existente Apostemate in uno crure, Phlebotomia fieri debet in altero, Phlebotomia. n. in eodem factā trahit materiā ad locum. Hęc tu.

¶ Nos autē, cū hanc tuā respōsionē primā, non remouere dubitationē asseruimus, in illa nō ultra progrediemur, Sed aliā modo positā refutabimus, Si quādoq; mi Curti diuertere licet per Phlebotomiā factā in latere opposito, & in Apostemate existente in crure, cur nō conuenit idem fieri in Pleuritico morbo? & quā ob causam ratio, quam adduxis qđ Apostemate existēte in uno crure, Phlebotomia fieri debet ī altero, nō militat in Pleuritide? uidelicet qā missio sanguinis facta in eodem, trahit humorem ad locū. Iccirco, nulla respōsionum existēte ualida. Quarta pōnis, q̃ potius Galenō repugnat, q̃ eius mentē declarat.

¶ Inquis. n. plus trahit a dextro ad sinistrū Phlebotomia dextri lateris q̃ Phlebotomia sinistri, ut declaratum est, qā euacuato fonte magno ex parte dextra, riuuli partis dextrę fluunt partem sinistram uersus.

¶ Hęc respōsio ea est, quā supra me nō intelligere dixi, nec nō intelligo, Tñ, si id uerū est, qđ sentis, & ob hoc potius fieri debet Phlebotomia in parte lēsa, cur Galenus in crurū Apostemate nō facit Phlebotomiā in parte lēsa, sed ī parte sana illi opposita? Rectū. n. est dicere Galenū hoc sciuisse, qđ asseris, Et, si hoc melius fuerat, hoc mō fuisse operatū omnino credendum est, Cū autem Galenus non in parte lēsa, sed

DE INCISIONE VENAE IN PLEVRITIDE

in parte sana sibi opposita uenā inderit, ergo nō sciuit, aut si sciuit, & aliter optus est, calūniā patitur, si hoc melius erat. Tu uero, q̄ eius doctrinæ (& merito) es obseruatissimus, q̄ eius opinioni sunt cōsona, non ea, q̄ dissonāt, ī mediū adducere debes, Patet itaq; hāc tuā rōnē p̄mā, q̄ cōtra te adduxisti, īsolūtā esse, & tāq; ualidissimā, & maximo robore fūdatā, Achille dici posse. Nūc uero ad ipsū Hectora trāseamus.

¶ Inquis tu, Solet secundo argui, in cura Phlegmones utimur tripliā euacuatione ex loco, ut clare Gale. uult in. ii. de febribus ad Glauconē capite. viii. & .iii. Therapēticæ cap. vi. qđ ē rōne p̄batur, qā, ut habetur. xiii. Therapēticæ, in principio, in omni Phlegmone, quæ est in fieri, cōuenit p̄seruatio quantū ad id, qđ est futurū fieri, quæ sit cū diuersione, & cura, quantū ad id, qđ est factū, q̄ sit cū deriuatione, qñ nō est & gritudo antiquata, & cū euacuatione ex loco, qñ est antiquata, Cum igitur euacuatio diuersiua præcedat deriuatiuam euacuationem & Phlebotomia eiusdē lateris sit deriuatiua, oportet prius facere, Phlebotomiam oppositi lateris.

¶ Hæc ratio tua uir clarissime est efficacissima, & meta ueritas, qđ magis apparebit, & facilius cognoscet, si consideraueris, quā parū Galeni mentem attingat responsio tua, Cum inquis.

¶ Respondetur ad hoc argumētum, qđ indicatione sumpta a materia fluente, & q̄ fluxit, sine dubio prius materia fluēs est diuertenda, secundo materia, q̄ fluxit, est deriuanda, Tamē indicatione sumpta a loco, ubi materia facit Apostema, cōtingit aliquando, qđ eadē euacuatio est diuersiua, & deriuatiua, Dicit. n. Galenus clare in. ii. de febribus ad Glauconē cap. viii. qđ, qñ materia est ī capite, faciēda est Phlebotomia in Cephalici eiusdē lateris, siue diuertere, siue deriuare uolueris, Secus est in Apostemate Matricis, qā, si in eo uolumus diuertere, facimus Phlebotomiā in Basilica eiusdē lateris, si uero deriuare, fieri debet in poplite etiā eiusdē lateris, Eodē mō dico in Pleuritide, qđ Phlebotomia eiusdem lateris est diuersiua, & deriuatiua, Et ita patet, qđ indicatio sumpta a membro læso uinat indicationem sumptam a materia, prout fluens est, aut fluxit, Nec semper fieri debent duæ Phlebotomiæ, quarum una sit diuersiua, & altera deriuatiua. Hæc tu.

¶ Sed cur tam recte opinionē Galeni nosti, nec tñ eā (ut decens erat) defendisti? nō potuisti efficaciorē, atq; clariorē rōnē adducere p̄ ueritate, & Galeni mēte, q̄ ea sit, q̄ adducta est, qđ facilius cognoscet responsione tua diruta. Non ne Galenus citato loco ad Glauconē dixit, fluētis humoris

tis humoris medelā esse retractionē, & eius, qui fluxit, medelā esse de-
 rivationē; uere dixit hoc, & indicationē sumpta ab humore mouit hoc,
 uel illud esse operādū, nō ne & ex his, q̄ dicta sunt, apparet prius debe-
 re Medicū executioni mandare humoris fluentis medelam; quo perfe-
 cto ope, & nō eodē die, eius, qui fluxit; oīa patēt ex supradictis, Fa-
 teor tamē hēc in opus minime duā posse, & rectē, nī patiens locus, &
 eius positio cognoscatur, ut sciat Medicus, unde, & quomodo prius re-
 tractionē, deinde derivationem facere debeat, Qui. n. retrahere uult,
 duo intēdit, & a duobus cōsensum sumit, intendit. n. humorē fluētē,
 & illū ducere ad cōtrariū locū loco particule patientis, hoc autē rectē
 facere non potest, nisi sciat sitū particule patientis, quo cognito, consi-
 derabit an locus iste patiēs, & ad quē humor fluit, sit superius, an in-
 ferius, dexter, an sinister, Et tunc uel Phlebotomia, uel alio adminicu-
 lo hunc fluentē humorē ad contrariū locū particule patientis uertet,
 Aliter nō esset expleta intentio medentis humori fluenti, Cū uerō me-
 delā adhibere uoluerit humori, qui fluxit, quæ post retractionē ad si-
 nē perduatū, derivationē faciet per uenæ ināisionē secundū rectitudi-
 nē patiētis particule, & ad latus, hoc. n. exigit derivationis opus, &
 sic apparet, qđ patiēns particula in ambobus opibus consideretur, non
 qđ patiēs locus indiēt, & cōsensum det Medico, qđ fiat retractio, aut
 derivatio, hęc enim indicantur ab humore. q̄ fluens est, aut q̄ fluxit,
 & hęc a tēporibus A postematū indicantur. Cum igitur Medicus fixe-
 rit prius animo suo, qđ modo adhibenda est humori fluenti medela,
 quia A postema est in principio, modo uero applicanda est medela hu-
 mori, qui fluxit, scilicet derivatio, quia A postema est in statu, & flu-
 xio restitit, tunc perquirat locū, ad quem uult retrahere, uel locum per
 quem uult derivare, & hunc ipsum docet particula patiēs, Inquit igi-
 tur sapiens Medicus modo, quia in principio intentio mea est humorem
 fluentem retrahere, hoc autem fit ad contrariū particule patientis,
 sed talis particula patiēs est in dextro, ergo tale retractionis opus fieri
 debet in sinistro. Oportet igitur, ut Medicus prius animo suo firmet, an
 retrahere, an derivare uelit, in hoc autem consensum habebit a tem-
 poribus morbi, ut si A postema fuerit in pncipio, i quo tpe materia fluit
 animo suo figat retractionē, Si uero fuerit in statu, i quo humor fluxit
 figat derivationē, & his animo suo reuolutis, & stabilitis cōuertet se
 ad particulā patientē, & ab ea cōsensum capiet, ex quo loco, & p quā
 uenam fieri debeat opus illud retractionis, aut derivationis, Indicatio

DE INCISIONE VENAE IN PLEVRITIDE

igitur sumpta a particula patiēte nō hēt introitū ad insinuandum Me-
dico, qđ retrahat, aut deriuat, quę prius sunt cōsiderāda a Medico, q
p quā uenā, aut in qua pte sit faciēda retractio, aut deriuatio, Quid
igitur est id, qđ a te dictū est, qđ indicatio sumpta a mēbro lēso uināt
indicationē sumptā a materia, prout fluens est, aut fluxit. Si. n. intelli-
gis, qđ nulla indicatio sit a materia, prout fluēs, aut fluxit, profecto id
cōtra Galeni decreta dictū est, qui uult, ut supra ostensum est, Medi-
cū habere duplicē solitudinē, unā ad fluētē humore, alterā ad eum,
qui fluxit, & fluentis humoris medela est retractio, eius uero, q fluxit
deriuatio, a materia igitur fluente Medicus pseruatiuus capit indica-
tionē diuertendi, ab humore autē, qui fluxit, Medicus curatiuus sumit
indicationē deriuandi, & sic utrūq; cōsiderat, & ab utroq; capit con-
sensum sui operis, & quid acturus sit, Si uero intelligis, qđ indicatio
sumpta a membro lēso uināt indicationē sumptā a materia, ut fluens,
aut fluxit, qā indicatio sumpta a materia, prout fluens, aut fluxit, nō
præbet cōsensum de qua uena, aut de quo loco fieri debeat missio san-
guinis, sed sola particula patiēs hoc indicat, cōcedimus profecto id esse
Galeni placitū. Sed particula patiēs nunq̄ dabit assensum, quod ex cō-
trario, aut ad latus Phlebotomiā facias, nisi prius animo tuo cōstituer-
is, an diuertere, an deriuare uolueris, qđ ab humore, put fluens, aut
fluxit, indicatur. Si igitur tibi cōstiterit esse diuertendū, particula pa-
tiens, & eius positio indicabit locū cōtrariū, Si deriuandū, locū ad la-
tus, utriusq; igitur opus est Medico considerationē habere, Nec una in-
dicatio aliā uināt, cū utraq; sit necessaria. Nec me latet quādoq; Phle-
botomiā esse retractiuā, & deriuatiuā respectu particule patientis, si-
cut recte in exemplo fuit inductum, ut in dolore capitis Phlebotomia fa-
cta ex Cephalica eiusdē lateris, cū quo est dolor, Licet ea Galenus uti-
tur, ut diuersua, quia talis Phlebotomia habet ad particulā patientē
eā contrarietate, quę est superioris ad inferius, qua rōne illa Phlebo-
tomia dicitur diuersua, est etiā secundū reſtitudinē patientis partis,
ob quod dicitur, & nominatur deriuatiua Phlebotomia, Hęc autem
duo non reperiuntur, quādo in Pleuritico morbo uenā in idis ex eodē
latere cum patiente particula, liæt. n. sit secundū reſtitudinē patientis
loci, qđ requirit deriuatio, tñ nulla est ibi oppositio, qđ retractio exigit,
particula. n. patiens uideliæt Pleura, & uena in aſa in media sunt re-
gione, & iō nulla est scđm ſupius, & iſerius oppositio, Sūt ēt i eodē la-
tere scđm dextrū, & ſiniſtrū, ergo nulla ibi erit oppositio, ergo nulla
diuersio

diuersio. Principalis itaq; rō, qđ in suo robore pmaneat manifestū est.

¶ Prosequeris deinde unū scribendo, maxima admiratione dignū in/ quis enim, ratio diuersitatis eorū, quę dicta sunt, est, quia, cum Apos/ tema sit in partibus superioribus, sicuti in capite, sumus certi, qđ mate/ ria fluit a deorsum in sursum, qđ massa materię est in uena Cæle, seu i/ trūco corporis, Et ita certi sumus. qđ phlebotomia deorsum trahēs est diuersiua, Et similiter, cū sit A postema in Matrice, uel mēbris inferiori/ bus, ita certi sumus, qđ materia fluit a sursum in deorsum, & qđ phle/ botomia Basilicę trahens sursum ē diuersiua, In genu aut, uel pede ē deriuatiua, Nō sic est in Pleuritide, qđ, cū sit A postema in medio pecto/ ris, pōt materia undiq; fluere, Et, qđ nō sumus certi, unde fluat, neāsse est, ut nesciamus, qđ sit uera phlebotomia diuersiua, qđ tunc diuertat, et trahat ad locū cōtrariū, Et pinde dicebat Galenus. ii. re. acu. cōmēto. x. qđ in Pleuritide itētio nostra ē plus euacuare a loco læso, qđ ab alijs mēbris, et ex cōsequēti faciēda ē phlebotomia eiusdē lateris, Hęc tu.

¶ Dic(queso) uir clarissime, ubi docuit Galenus nos scire debere lo/ cū, a quo incipit humor fluere, Et qđ inuamentū pręstat huius loci co/ gnitio; Forte dices Galenū docuisse diuersionē fieri ad cōtrariū, iō dor/ cēt sūre, si humor a sursum in deorsum fluit, aut ecōtrario, ut a deorsū in sursum reducatur, & ecōtrario, timentes enim A postematis augmē tum necesse est sūre locū, a quo incipit humor fluere, ut ad eundē per motum cōtrarium redeat, & tumoris augmentum uideatur.

¶ Galenus profecto nunqđ docuit nos sollicitos fieri in humoris reditu, nisi p remedia apposita in particula patiēte, Sed monuit, ut fluens hu/ mor ad cōtrariā partem particule patiētis retrahatur, & ob id esse ne cessariā cognitionē particule patiētis, situs, & positionis, non loci, a quo cępit humor fluere, Si. n. hoc uerū est, qđ asseris, necessariā esse loci cognitionē, a quo cępit humoris motus, ut ad eundē fiat humoris reditus, ratio duceret ad incōmodū, Fluēte. n. humore a superiori, aut ab inferiori, aut a sinistra parte, existēte læsa dextra, Basilicę dextrę incisio in eodē latere nō cōpeteret, Hęc. n. uenę incisio, nō facit humorē redire ad locū, a quo cępit fluere, sed potius ad locū læsū unde quaq; trahit humorē, Nā Basilicę dextrę incisio trahit ab inferioribus ut pa/ tuit p te in A patibus Matricis, trahit ēt a superioribus, ut patuit i dolo/ re capitis phlebotomista Cephalica, et a fortiori Basilica, trahit ēt a si/ nistris, Ergo undecūq; trahit, ergo ad nullū locū facit redire humorē, a quo fluere cępit, Sed potius ipsū ab unoquoq; loco trahit ad partē

DE INCISIONE VENAE IN PLEVRITIDE

læsam, Et sic Phlebotomia, q̄ p te cõæditur ab Hippo. & Gal. esset incõueniēs, & noīua, si fieret in priāpio, & nullo mō faciēda, Sed, si ī sinistro fiat latere, & pte sana, undecūq; fluat materia, recte opamur inbibendo, ut nec a superioribus, nec ab inferioribus, nec a sinistris humor fluere possit ad p̄tē læsā q̄ illa Phlebotomia ab oī pticula corpis attrahit ad sinistrū loco dolēti oppositū, et cōtrariū, et hoc ē, qđ nos Gal. docet. ¶ Sed tu rīdeas quæso cū hac tua incertitudine loā, a quo humor floitur potius te ad partē læsā, q̄ ad partē sanā uertis, ibiq; phlebotomas nesciens an recte, an perperam opereris, & supra manifeste dixeris, qđ Phlebotomia facta in eodem trahit humorem ad locum;

¶ Dicis tu, Galenus sic nos docuit. ii. re. acm. Nō credas Galenū cū tali incertitudine sic usum fuisse, Sed sæpe diximus, qđ Phlebotomia, quā præcipit Galenus in particula læsa, est ea, q̄ derivatiua dicitur, & q̄ in statu sit, nō diuersua, & q̄ in principio sit, Cū aut cōis practicātiū medicorū schola diuersuā facit in parte sana, decreta tū Hipp. tū Galeni obseruat, q̄ ad locū patiēti particule cōtrariū uertit fluentē humorē undecūq; fluat ille, Nulla igitur est rō diuersitatis in A p̄te Pleuritico, & alijs A p̄atibus, q̄ in oībus, cū diuersio in principio faciēda ē, ad oppositā partē læse particule fiat, Licet forte nō idē genus oppōnis obseruetur, q̄ in aliquibus sit diuersio secundū supius, & inferius, ut in Apostematibus Matricis, & in dolore capitis, qñ phlebotomatur Cephalica, in aliquibus uero sed'm dextrū, & sinistrū, ut in hoc genere A p̄atum, Vel, si expressā Principis sniam imitabimur, fiet secundū supius, & inferius, Sed, utcūq; sit, stat sempiterna ueritas decreti Hippo. & Gale. nī delictet retractio, q̄ medela ē fluentis humoris, ad cōtrariā partē pticulæ patiētis sit. Hac eadē uia remanet efficacissima, et in suo robore munita ea, q̄ a te Secūdo loco cōtra te adduātur, rō, Icarco ad tertiā descēdamus, q̄ ī tuēda Medicorū practicātiū phalāge a me Hercules ē noīata. ¶ Tertio adducitur ualidissima Galeni autoritas, Inquis. n. diuersio est faciēda ad lōgissimā. xiii. Therapeutice distin. ij. cap. ij. ergo nō ex eodē latere, sed potius ex Saphena, huic respondes primo, qđ diuersio conuenit matriæ fluenti, & quia in Pleuritide nescimus locum, unde materia fluit, ideo nescimus, ad quam partem sit diuertenda, ¶ Et propterea facimus Phlebotomiam eiusdem lateris.

¶ Hac tua rīso eadē patitur uulnera, q̄ superior, nō. n. sciēdus est locus, a quo humor caput fluere, Sed cognoscēdus, est locus lēsus, ut ad cōtrarium illius trahatur humor, undecūq; fluat, In Costali morbo facile

facile Aegrotans cognoscit particulā patiētē, hęc igitur responsio nulla est, Sed pluries rem utilē repetere non est ab re. Cur locū, a quo cœpit humor fluere, desideras cognoscere; dicis, ut ad eundē sanā redire humorē, Sed cur hoc; nisi ut eundē a loco læso abigas, Cur igitur Phlebotomiā facis ex parte læsa, cū per illā, ut dictū est, nec ad locū, a quo cœpit humor fluere, undecunq; fluat, ipsum redire facis, nec a patiēte particulā fluentē humorē, tanq̃ molestū, odiosū, atq; damnosū fugas, et abigis, Immo ab oī corporis parte tū superiori, tū inferiori, tum a sana illi opposita humorē trahis, Cognoscas itaq; mi Curti positū pticulę patientis, & fluentē humorē ad contrariā partē sanā trabas, undecunq; fluat, & tunc a parte læsi fugabis damnosū humorem, qđ est Medici medentis propositum primum, & incorruptam, & perpetuam seruabis Hippocratis, & Galeni placuī ueritatem, cum dixerunt, retractio fit ad contrarium.

¶ Secūdo rīdes, qđ diuersio fit ad longissima, cū hoc tñ, qđ diuertatur materia fluēs, mō Phlebotomia facta in Saphena est tā ad longissima, qđ nihil diuertit de materia, q̃ est in uena Cœle, q̃ fluit ad Apostema.

¶ Hęc tua rñsio pluribus modis peccat, In primis. n. si tibi cōstare uis, nō turbat Gale. decreta, q̃ nūq̃, ut asseris, mētionē fecit Saphenę, Sed potius Principē taxat, cū dixit nos festinare ad phlebotomandum illā, Sed in nostra hac disputatione nō est in Arabis propositum primū.

¶ Peccat iterū hęc rō tua, cū longissimā diuersionē uoces eām uenę iñfionē, quę Saphena est, in dolore Pleuritico, nā, si in eodem fiat latere, ut fuit Principis præceptum, non uideo distantia esse nisi secundū unā diametrum, & etiā in completā, quem etiam modum, quandoq; natura obseruat, cum indicat Hepatis Apostema per fluxum sanguinis narium ex dextra nare, & tōmode, & apte facit, licet etiā sit ponēda maior distantia a regione, in qua positum est Hepar, quę est infima ad regionem, in qua nares ponuntur, quę est suprema, inter quas ponitur media, & difficilius sit naturę sanguinē ad superiora mouere, q̃ arti a superioribus ad inferiora attrahere. Neq; etiam inuentus fuit unquam Galenus, qui distantiam per unam diametrum carperet, & insamarret, Sed eam, quę est secundum duas, ut sæpe dictum est, cū non sit secundū rectitudinem patientis partis.

¶ Est & tertio hęc rō tibi molesta, nam, si phlebotomiā cōcedis diuersiū ad tantā distātiā, in quāta possit fieri fluentis humoris diuersio, cur negabis eam, quę est a dextris ad sinistram? Et maxime cum Galenus

DE INCISIONE VENAE IN PLEVRITIDE

ea usus fuerit in A postemate crurum, Tu quoq; supra affirmabas fieri posse diuersionē talem, qñ sola intenditur diuersio, Concedebas quoq; plus trahere a dextris Phlebotomiā factā in dextris, q̃ eā quā i sinistris, Tu autē ab usus esses cōparatione, nisi ea, quā est in sinistris, attraheret a dextris, Et, si hoc, cur fieri igitur nō possit? Et, si Galenus cōcessit Phlebotomiā Basilicā trahere in cōtrariū, A postemate existēte in Mātrice, & Cephalicā a capite, cur & Basilica dextra nō attrahet a sinistra, & e cōtrario? Profecto mi Curti hęc rō pluribus modis te angit, et torquet, Nec crēdas Prināpē tacere, & tibi manus dare, qđ ob id negāda sit Phlebotomia Saphenē, qñ inapit A egrotus a morbo Pleurítico infestari, quia lōgissima sit, & nō trahat materiā fluentē, tuebitur enī se p̃ceptoris sui placitis, qui diuersuā Phlebotomiā fēctā secundū re/ctitudinē patientis lateris, & per unā diametrū laudauit, & faciendā esse monuit, atq; p̃cepit, & scriptis reliquit, Et qđ phlebotomia, in quocūq; loco fiat, ab ea parte, in qua sit, euacuat, & ab omni corporis particula attrahit. Cui ēt motui suffragatur naturalis motus humoris, qui sua gravitate descendit, Plura itaq; et letalia uulnera patitur hęc secunda responsio, Ad tertiam accēdamus.

¶ Dīcis, qđ illud dictū intelligitur, qñ intendimus tantū diuertere, Et hoc est in cura p̃seruatiua, quia qñ inapit A postema (p̃cipue do/lorosum) intentio est nō solū diuertere, sed educere ex loco lēso, & hoc fieri nō pōt per Phlebotomiā factā ad longissima, & iō hanc snīam, qđ sit diuersio faciēda ad longissima, quā ponit Hippo. in libro de natura humana nouiter impresso cū cōmento, Galenus exponit eā nō esse in/ telligendā, cū inapit fieri A postema, sed in cura p̃seruatiua. Et subdis, qđ ēt colligitur in textu de phlebotomia, doctrina secunda summe. 4. capite. y. &. xiii. Therapeuticā loco supra alleg. post q̃ dixit diuersionē esse faciendā ad longissima, subiungit, qđ dixi, patet in tractatu de mē/ da ualitudine, et in tractatu de phlebotomia, et de medicinis purgan/ tibus, Hęc tu.

¶ Quanto plures responsiones das mi Curti huic rōni, quā Herculē no uinani, tanto uideris fauilius a placitis Sapientū deniare, Sed (oro te) a proposito non discedamus, In quo querimus an in Costali morbo cōpetat diuersio, nō dico longissima, sed tanta, quanta est ab humero ad humerum, a dextro ad sinistrū, & ccontrario, Tu dīcis longissimā cōuenire, qñ medicus intendit solum diuertere, Sed, si cum hac proposi/ tiū habeat educēdi, & euacuādī a loco lēso, non pōt hoc fieri p phle/ botomiam

botomiā factā ad longissimā, Quid autē p longissimā diuersionē intel-
ligas, & ad quātā distantia contrariā fieri debeat Pblebotomia, non
declaras, Ego uero sapientiū praecepta mente reuoluens asserā illā esse,
quae secundū duas fiat diametros, quā Galenus in aegritudinibus insu-
manit timens uirtutis dissolutionē, An uero haec cōueniat sanis, paratis
& cōsuetis in aegritudines cadere, non est praesentis laboris hoc discute-
re, In eo uero diuersionis genere a sapientibus cōprobato eā uoco lon-
gissimā, quae per unā sit diametru cōpletā, Sed eo sermo redeat, unde
ortū habuit, Cur nō approbas uenae inātionē in parte sana in ea oppo-
sitione, quae est a dextro ad sinistru, & ecōtrario? Dicit, qā talis diuer-
sio fit eo mō, qñ sola intēditur diuersio, Sed in Pleuritico morbo requiri-
tur nō solū diuersio, sed euacuatio a loco leso, Icarco in parte lesa, &
non in sana fieri debet Pblebotomia, Sed mi Curti nōne cōcessisti Pble-
botomiā Cephalicē dextrae, oculo dextro patiēte, esse Pblebotomiā di-
uersiū, & deriuatiū? & tñ Pblebotomia ista non est simpliciter in
parte lesa, quae est superior ad locū uenae inīse, Dices tu, est in parte
lesa, qā in dextra, optime dicit, & ob id saluatur rō deriuationis, Sed
non saluatur ratio diuersionis, si ibi nulla esset cōtrarietas, Et icarco cō-
cesso, quod ibi sit non sola diuersio, sed etiā deriuatio, tñ ad saluādā ra-
tionē diuersionis oportet, quod cadat oppositio aliqua, quod in modo
tuo Pblebotomandi in Pleuritide non obseruetur.

¶ Quero etiā a te Curti, quādo Galenus, Apostemate existente in cru-
re dextro, fecit Pblebotomiā in sinistro, fecit ne diuersiū tantū, an di-
uersiū, & deriuatiū? Nō diuersiū tantū, qā haec p te in opere fit p-
seruatiuo, & quādo Apostema non incipit fieri, & talis etiā p te fit ad
longissimā, Sed, si diuersiū tantū intēdebat, ut coactus es a ueritate
confiteri, cur in Pleuritico morbo idē facere non debemus, in quo nullā
assignamus oppositionē, nisi eā, quae est secundū dextrū, & sinistru,
qualis est in eo genere Apostematis crurū? Quod si diuersiū, & euac-
uatiū intēdebat, sicut in Pblebotomia Cephalicē dextrae oculo dex-
tro patiēte, quare hoc idē nō obseruas in Pleuritico pblebotomādo in
parte sana, nō pte lesa, ut fecit Galenus, & fiet diuersio, & euacuatio.

¶ Cur etiā mi Curti non es naturae emulus, quae cum iudicat Hepatis
Apostema per fluxū sanguinis nariū ex parte dextra, uno, eodēq; tem-
pore diuersionē facit, & euacuationē, nec ipsi obstat oppositio secundū
superius, & inferius? Dices tu, timeo multiplicare Pblebotomias, cum
hoc minime sit neccessariū, uidelicet facere diuersiū in opposito loco, &

DE INCISIONE VENAE IN PLEVRITIDE

deriuatiuam ex eodem, Oro, ne timeas Curti, Galenus enim libello de Pblebotomia. ii. summa, capite. vii. dixit, Quicūq; secundum Pharyngem, & Arteriam, pblegmōnant ualde, in prināpio quidem, quae secundum cubitum, Pblebotomia, post eam uero, quae ab ipsa lingua, auxiliatur multum, in asis ambabus, quae sub ipsa, uenis. Hec Galenus, qui non utitur prima, ut deriuatiua, sed ut antispastica, & diuersiua, Pblebotomia autem uenarum sub lingua uere deriuatiua est, nec uno die fiunt, sed interpositis diebus, ut diximus, Non enim credendum est in eodem die A postema currere per omnia sua tempora uniuersalia, & ideo non totam intentionē, quae duplex est, diuersio, & deriuatio, uno die expleri, Sed prima in prināpio, secunda in statu, Seruat igitur incorruptum, & perpetuam ueritatem propositio illa, Retractio fieri debet ad longissima, nec quod a te additur, ubi scilicet sola intenditur diuersio, tuae opinioni quicūq; patrocinatur, De his haecenus,

¶ Quod uero ulterius scribis, illud dictum, diuersio fit ad longissima, intelligi, & ueritatem habere in cura praeseruatina, & non, quando ināpit A postema, hoc (quam) falsum mihi apparet, Nā Galenus. xiii. Therapeuticae citato loco eam aliter intelligere uidetur, Ibi enim secus rasse fitetur quosdam, quibus oculi tentari Pblegmone cōperant, sola purgatione per aluum, & addit, quamobrem, si quis in loānere, cum Pblegmone laborare ināpit, tentet, maximam excitabit Pblegmōnem, & adducens causam subiunxit, Siquidem longissime a tentata fluxiōe parte auellere, nequaquam ad eam trahere conuenit, In hoc loco patet diuersionem, quam mandauit esse faciendam ad longissima, fuisse, quando iam Pblegmone incepit, & usui mandari iussit paulo infra, cum dixit, Illud enim patere (uel me tacente) arbitror, cum, cui cura Pblegmone laborant, non esse uel ambulatione, uel cursu excitandum, Sed nec stare illi iubendum, immo sedenti plurimum fricari, mox manuum motu excitari, illi satius est. At, si cui in supernis partibus cōperit pars aliqua Pblegmone tentari, huic motus ex ambulatione, aut cursu est salutaris, Et causam assignans dixit, Quippe praecceptum in contrarium auersionis in omnibus talibus commune est, Quis est, qui dubitet diuersionem hanc esse ad longissima? & eam praecipisse Pblegmone ināpiente. Sed paulo post dicit, sed ad partes, q̄ maxime longinquae sunt, auersionē facies, aestimata Pblegmōnes magnitudine, tū corpus totius statu, Quomō igitur proloquiū illud nō uerificatur, qñ incipit A postema, si fieri illud dicat, aestimata magnitudine Pblegmones?

¶ Cum

¶ Cum uero adducis Hippocratis auctoritatem, qui in suo libro de humana natura nouiter impresso cum commento Galeni dicit, qđ diuersio fieri debet ad longissima, concedimus, At, cum dicit, qđ Galenus in commento asserit illam propositionem Hippocratis non esse intelligendā, cum incipit fieri Apostema, sed in cura præseruatiua, hoc audacter negamus, non enim inuenies Galenum hoc dicentem, Sed, qđ Galenus in commento dicit, est, Quod cum Hippocrates non definiuit, utrum, dolentibus iam membris, uelit longe retractionem fieri fluentium humorum, an tempore sanitatis, in hoc posset quis Hippocratem accusare, Sed in quibus fuerit Hippocratis mens, declarat dicens, Mihi quidē uidetur magis de sanis dictum esse, et causam huius iudicii adducens, dixit, Volente scriptore propter hæc assuescere in alias particulas ferri abundantes humores, hæc Galenus, Ex quibus nō habetur, qđ propositio Hippocratis non verificatur, quando incipit Apostema. Quinimo a Galeno habetur, qđ retractio ex eadem fit uena in homine sano, consueto pati in aliqua parte corporis, ex qua fit, quando in illa parte incipit pati, hoc enim manifestum est legenti librum de Phlebotomia summa. ii. capite. vii. cum inquit, In quibus autem corporibus ulla nō dum patitur particula, præuenimus euacuare, uere imminente, In his siquidem affuetis hominibus, et gradinibus capi febrilibus, hora estatis, euacuare abundantiam eorum affectamus, omnis pars in ablationem sanguinis etque pretiabilis est, id est etque honore digna, quemadmodum deinde et si Arthriticus fuerit quis, omnibus articulis patiens, postea subsequitur, Quibus uero aliqua particula præcipue molestat, non præeuacuatis, non oportet facere euacuationem etque pretiabilem ex omnibus particulis, sed, sicut incipientibus iam pati et dat exemplum dicens, Quocirca Podagricos quidem a cubito oportet euacuare, Epilepticos uero, et Scoromaticos a cruribus magis, Ecce igitur, quod Galenus docet, qđ ex eadē uena retractionem facias in sano, consueto pati in aliqua particula corporis, et in eo, in quo iam talis particula incipit pati, Et hoc profecto est ueritas, qđ illa propositio, Diuersio fit ad longissima, et in sanis, et in his, in quibus incipit Apostema, habet ueritatem, ut supra fusius in egrotare incipientibus Galeni exempla manifestarunt, Et ob id, qđ tā in sanis, qđ in etgris verificatur, qđ diuersio fit ad longissima, Galenus citauit eam in libro præseruatiuo, et de tuenda ualitudine, et in libro curatiuo, ut. xiii. Therapentice, et ob id etiā dicit in tali commento, qđ quis posset accusare Hippocratem, qđ

DE INCISIONE VENAE IN PLEVRITIDE

non definiuit, utrum, dolentibus iam membris, uelit longe retractione fieri fluentium humorum, an tempore sanitatis, & ipse Galenus soluens hanc dubitationem uoluit, quod, licet tam de sanis, quam de ægris sit uerū, quod diuersio sit ad longissima, tamen Hippocrates intellexit sermonem suum in sanis, & adducens causam ex dictis in casu Hippocratis dixit, quia uoluit Scriptor Hippocrates, quod propter talē diuersionem ad longissima, humores abundantes assuescant ferri in alias particulas, dicebat. n. Hippocrates, Sic enim magna mutatio repente non fit, consuetumq; mutabis, ne amplius illic coeat, Hec Hippocrates, Patet igitur qd', cum in ægrotare incipientibus nō faciāmus diuersionem, ut humor ille consuescat ferri ad alias particulas, sed ut inbibetur p̄ tunc augmentum Apostematis, icārco dictum Hippocratis debet uerificari, & accipi, pro sanis, & non pro ægrotis, licet etiam in ægrotis, cū sit diuersio fieri debeat ad longissima, considerata magnitudine Phlegmones, & totius corporis statū, ut supra ex Galeno. xiii. Therapeutice fuit inductum. In cæteris autem rationibus contra te inductis non immorabor, cum in manutenenda opinione Galeni, & cōmuniter praeficantium numerus ternarius uirorum illustrium Achillis, Hecforis, & Herculis sufficientissimus sit. Hec itaq; sint, quæ ad mentem Græcorum scribere placuit.

¶ Nunc uero iam tempus est receptui cancre, quod libētissime exequar ne librum potius, q̄ epistolam scribere aggressus uidear, si pauca admodum in opinione Arabum dixerim, ne etiam ipsi dissoni, & minime cōformes præceptoribus suis, & alieni uideantur ab eo quod sapiētissimi, & uetustissimi Medici scriptis reliquerunt. Ais tu Rasim uoluisse, in Pleuritico morbo, ut plurimum eueniente, faciendam esse phlebotomiā ex eodem latere, In corpore autem multo sanguine repleto, quod ut in paucioribus reperitur, phlebotomia prius fiat ex opposito, deinde ex eodem, & inquis, qd' Saphenæ non meminit, ut Princeps, quia de detractione tantū, & non detractiua intendebat, & subdis, qd' Rasius uisus est Galeno dissentire, quando phlebotomiam retractiuam ex opposito latere præcepit Rasis, Galeno hoc negante, forte quia opinatus est Galenus, qd' per phlebotomiam ex opposito latere dissoluitur uirtus sine inuamento, uel non euacuatur humor in loco lēso cōtentus, cui Rasis respondet (ut inquis) minime timere uirtutis dissolutionem, quādo corpus multo sanguine repletum sit. Nec est mihi curæ, dicit Rasis, si due sunt uenæ inasiones, interpositis diebus in tali, quale est sanguineum corpus,

corpus, In hoc enim uirtus multa conseruatur, Sed in costali morbo a Cholera uis Rasim uoluisse missionem sanguinis fieri ex eodem latere, & asseris, qđ huic opinioni subscripsit Princeps, pręterqđ qđ Princeps Saphenę meminit, Hęc (inquam) mi Curti menti meę non sunt omnia consentanea, placet ualde, quod dicis, Rasim, cum scripsit, qđ in plenitudine ut plurimum eueniente, & a Cholera, sit phlebotomia ex eodē latere, intellexisse de deriuatiua, & non de diuersua, Sed Rasim solū a Galeno differre, quia Galenus nunquā diuersuam ex opposito pręcepit, quod Rasis in sanguinea fieri iussit, ergo, cum ex eodem latere pręcipiunt, ambo de deriuatiua intelligunt, & hęc est ueritas, quem intellectum si uerbis Hippocratis in .ii. re. acu. & Galeni in libro pręsertim de phlebotomia accommodasses, ueritas ubiq; manifesta esset. Sit igitur sentētia tua ubiq; una, eademq; ac dicās Hippocratē, Galenū, Rasim, & Principem, cum de Phlebotomia loquuntur ex eodem latere esse faciendam, eam intellexisse, quę deriuatiua est, quę cum sit mede-
la eius humoris, qui fluxit, non, nisi tempore status, fieri potest. Remouenda est itaq; a conclusione tua, qđ hęc in prināpio conueniat, si deriuatiua intelligitur tantum, ut est mera ueritas, quę nullam patitur difficultatem, Ideo nec Hippocrates, nec Galenus eam posuerunt particulam.

¶ Quod uero asseris Galenum timere uirtutis dissolutionem in faciēdo Phlebotomiam ex opposito, cum diuersionem facit, hoc repugnat Galeni decretis, qui semper diuersionem ad contrarium pręcipit, quod minime scriptis reliquisset, si periculum esset incurrendi uirtutis dissolutionem, Nec ipse usui mandasset, cum Phlebotomiam fecerit in crure sano, altero patiente, nec operi naturę cōsonat, quę ab infima regione, in qua est Hepar, per narem dextram in supremo positam recte, & cōmode iudiciū facit, Nec etiam cōmunis Medicorum schola id, qđ scribis, comprobat, cum, omnium consensu, in Phlebotomando Gręci audaciores habeātur, qđ Arabes, Sed, quod dixit se timere Galenus de dissolutione uirtutis, absq; hoc, qđ passionem leuet, intellexit de Phlebotomia facta per oppositam partem, & non secundum reſtitudinem patietis particulę, ut i A postemate Hepatis fluxus sanguinis factus per narē sinistram, quia fit p duas diametros, & hoc est, quod Galenus de Phlebotomia libro summa. ii. capite. iiii. infamauit, & non, quando diuersio fit per unam diametrum, quia etiam hoc natura faciens comode facit, ut diximus, oris artifex libentissime est annulus.

¶ Quod uero Rasis in diuisionibus proprio capite dixit in cura Pleuritis a Cholera, et cura eius est Phlebotomia, sed ex latere doloris de Basilica, non posuit Rasis dictionem, Sed, aduersariam, ut contrarietur ei, quod dictum fuerat de Phlebotomia diuersa in opposita parte facienda, Nam ipse in lib. vii. ad Almanforem capite. xi. expressit modum faciendi Phlebotomiam in A postematibus calidis, & dixit, Cum in aliqua corporis parte exoritur A postema, cuius tactus calidus sentitur, eius cura a Phlebotomia est incipienda, ut, si in parte (uidelicet) fuerit dextra, in sinistra de uena mediana fiat Phlebotomia, Et e conuerso, si in sinistra, in dextra Phlebotomia est facienda, Phlebotomia tamen ex uena Basilica, aut mediana est facienda, Hec Rasis, & ex illis quae in capite sequuntur, patet quod sermo etiam est de calido Cholericco, quum Erysipelatis meminit, At aduersariam dictionem, Sed, posuit, ut aduersaretur audaciae phlebotomantium, nam, ubi Sanguis peccat solus, audacter est phlebotomandum, ubi uero alii humores (cum sanguine consideratius est procedendum, Et sic obseruatur placitum Galeni. iiii. de tuenda ualitudine, cum dixit, Nam, quoniam alii prius, quam ad exactum Sanguinem nutrimentum peruenit, ueluti semicotti sunt, alij prorsus incocti, crudiq; alij paulo absunt a sanguinis forma, Rursus alij sanguinis faciendi, siue (ut ita dicam) sanguificationis, ueluti ultima pars, qui utiq; ex assu caloris proueniunt, quorum alij paululum uel citra sanguinem restitum, uel ultra processum est, audacter mittendus sanguis est, ubi plus, consideratius agendum, ubi plurimum, in his nullus omnino mittendus est, haec Galenus, Rasis itaq; in corpore, ubi sanguis peccat, expressit diuersam phlebotomiam ex opposito, quia audacter phlebotomari potest, Vbi uero peccat Cholera cum sanguine, non negatur diuersio per oppositum, Sed Rasis aduersatur audaciae Medicorum phlebotomantium, cum in hoc genere reuerentius Medicus procedere debeat. Patet itaq; in omni Pleuritico morbo ut plurimum eueniente, cum ob sangninem superantem, uel ob Choleram cum sanguine mistam fiat, fieri debere in principio diuersam phlebotomiam ex opposito latere, magis quidem audacter in sanguineo, consideratius in Cholericco, Patet etiam, quod in omni Pleuritico morbo, corpore existente pleno, fieri debet phlebotomia diuersa ex opposito latere in principio, cum, ut plurimum, fiat uel sanguine superante, uel Cholericco sanguine, et hoc uerum est, siue a gradibus Pleuriticae, ut plurimum eueniant cum plenitudine, uel sine, quod semper, corpore existente pleno fieri

fieri dedet ex opposito Phlebotomia, & quod quando Rasis præcepit Phlebotomiam ex eodem tu dicis (& sic est ueritas) quod intellexit de deriuatiua, & non de diuersua, & patet, quod hanc eandem intentionem habuerunt Hippocrates, & Galenus, quando scriptis reliquerunt, in Pleuritide esse phlebotomandum ex eodem latere, ut de simili fiat simile iudicium, cum etiam ueritati omnia consonent, Et, cum tu hunc intellectum habueris, concordiam facies inter Græcos, et Arabas uniuersalem, & asseres idem, quod communis præficientium, & legentium schola usui mandat, & docet, Quam concordiam firmare & tibi & omnibus placeat, ut dicere possim. Congratulamini mihi, quia inueni Genmam, quam perdideram, Et, ualeant omnes, qui inter nos dissidium querunt. Atq; si aliqua fuerint hic a me perperam dicta, corrigas oro, si recte, hilari uultu ab amico exipias. Me ames, & Doctores, Auditoribusq; Patavinis me plurimum commendes, Vale. Ex Vrbe. vi. Idus Maii. M. D. XXVI. CLEMENTE. VII. sapientissimo, optimoque dominante.

¶ Expectate Iuuenes, quod reliquum est, in iugulanda hac in medicina Lutherana hæresi, nouum meum opusculum, in quo Petro Brissot, Manardo, & Curtio satisfaciam, bene Valete.

¶ Impressum Bononiæ per Hæredes Hieronymi de Benedictis, die primo mense Februarij.
M. D. XXXIII.



RATISSIMI Discipuli officii
esse arbitror Beatissime pater, quæ Il
lustres medici communi hominū utili
tati publice sunt professi, aut nō sine
maximis eorum laboribus in nostrū
commanenti usum scriptis reliquerūt
omni conatu à cavillamentis, & ma
ledicetium nugis strenue defendere,
& eorum latratibus, ac maledicta nul
lo timore propulsare. Quo factum est
ut cum **Mattheus Curtius** nostro se/
culo vir famigeratus contra commu-

nem practificantium medicorum scholam in pleuritico morbo alienum
medendi modum in præclarissimo Gymnasio Patavino non sine maxi
ma hominum iactura inuulgauerit, mihi etiam placuerit certare secū,
& hanc in arte medica lutheranam sectā penitus extirpare, quod mea
ad ipsum Epistola satis me fecisse arbitror, In qua loci inuadende uene
in costali morbo communem medicorum opinionem placitis Hippocra
tis & Galeni conuenire clarescēdemonstrauī, Et rationes eius uel cauilla
potius penitus ē medio substuli, Licet inde Curtius (ut fama est) opinio
nibus suis delectatus, quæ eius intellectum sic obstruunt, ut alia (licet
uera) minime intelligere possit, replicare studuerit. Et si ne minimū quī
dem satisfecerit. Fūdamēta enim quæ nos Galeni satis conformia esse
diximus, suo in robore firma & ualida nobis reliquit, Inuictissimas etiā
& minime solubiles rationes quibus opinio communis se firmam & cō
stantem facit, quasq; Curtius contra se adduxit in suo etiam robore fir
mas, & minime instabiles dimisit, responsiones suas uanas, futiles, inu
anes, ac in opere mediāne nullam utilitatem pre se ferentes, ostendentes
& re ipsa etiam lucē clarius demonstrabimus quantum non solū Cur
tius, sed Ioannes etiam Manardus, necnon Petrus Brissot uir profecto
mira doctrina præditus, Qui primus inter nouissimos hanc erexit opi
nionem, à ueritate deflexerint. Nūc uero alius contra ipsum Curtium
mihi instat labor, cui (ut uideor) datum est has Curtij nouas opinio
nes iugulare, ut de ipso facile dici possit, semp Curtius aliquid noui affert,
Sed illud esse monstrum nemo non scit, Odus enim de odis patavinus
uir multæ eruditionis præceptori suo addictus aliam de carne laudibus
& prandij execrationi opinionem, non minus Sanctitati tuæ pernicio

jam (ut puto) in lucem edidit. Affirmatque Curtium primum, & cui medica facultas (probat scilicet bonitatis & blasphemiam) non minus debet quam Galeno, tanquam ab inferis ad vitam revocasse. Miror non minus Curtii cupiditatem quam Auctoris in contradicendo patribus suis. Cum laudare equum sit eos, qui explanaverunt quae recte ab alijs sunt dicta; & quod si quid omisissum est, id suppleverint, cum fieri non possit, ut idem incipiat, & perficiat, quin potius ipse Curtius culpandus est, qui adeo est delicatus, ut nihil disere substineat eorum, quae commode dicta sunt, Et qui adeo est ambitiosus, ut studio novorum dogmatum semper aliquid astute texat, & cavilletur. partem callide oppugnet, omnes generosos medicos supergredi se putans quasi illis plus sapiat, opinionis eorum non meminerit. Verum tot tantisque non assentiri viris, sed plus se sapere, quam illos putare sine invidia esto. Sed cum nos docere voluerit quae ipse tenebat, sibi prorsus nominibus pro rebus uti erat opus. In quorum usu claritas quasi meta spectanda erat. Nam qui sic nominare quaeque studet, ut qui discit, clarissime intelligat, tunc optimus praeceptor erit. Quod si de nomine cænae & prandij de qua hora cænae apud antiquos consulisset sapientes, non in tot incidisset incommoda, sed quae modo nos dicimus, proposuisset. Quinque sunt apud nos abationum nomina, quorum declarationes praeponende sunt à nobis Galenorum imitantibus, qui cum de aliqua re disputationem facturum erat, Nominis multiplicis significationis ambiguitatem imprimis tollebat. & in quo significato sermo eius futurus erat lucè clarius declarabat, Quod si Curtius fecisset, non facile de cæna & prandio pronuntiasset, quae postea Odis in lucem edidit. Nos igitur Galeni doctrinæ emuli cænae vocabulum prius distinguentes, quam significantiam admittat quaestio proposita, declarabimus. Ieritaculum igitur, quod primum horum est, abus & potus dicitur matutino tempore sumptus antequam homines opera aggre-diantur prandium siue prandiculum quidam nominant, quod à vino mero & non lymphato graeci nomen sumpserunt, quod sicut in prandio, merenda, cæna, commessatione dilutius ita in aurora merandus bibere & salubre putatur, & usu receptum est. Prandium vero tribus dicitur, qui ante meridiem finitur graeco vocabulo ab edendo dictum quasi commune sit vocabulum omni abationi. Merenda dictus est abus, qui ante cænam fit. Cænam veteres eam dicebant, quam nunc prandium dicimus, & quam nunc cænam dicimus vespertinam vocaverunt. Ultima

re. Vltima uero est commessatio, qui est cibus, qui post cenam sumitur, qui maxime apud Vircilium imperatorem in usu fuit, & licet multa alia circa hæc diu possint, uolo tamen quoad nostrum proposito deferui-
ant hæc sufficere. si tamen prius aliqua de hora cene prælibabimus, Cæna apud antiquos Romanos inclinante in occasum sole primo fieri solebat, dum. s. patresfamilias in agris colendis uersabantur, quæ hora est ab ipso opere recedendi, unde & apud grecos dictum uolunt quod pausam laboribus faciat, adeo ut ad ipsos dies festos nihil addidis-
se diu uideantur, nisi ut solito citius aliquantulum ad cenam irent. Si-
militer si ad nuptias ab amicis uocati essent, quod quidem & Iuena-
lis innuere uidetur cum ait. Moris erat quondam festis seruare diebus
Et natalinum cognatis ponere lardum. Accedente noua, si quam dar-
bat hostia, carne. Cognatorium aliquis titulo ter consulis, atq; Castro-
rum imperijs, & dictatoris honore Functus, ad has epulas solito matur-
rius ibat Erectum domito referens à monteligionem. Postea uero quam
in urbem omnes inuini grauerunt, quod ante Varronis tempora conti-
gisse satis constat. Quandoquidem de hac re conqueritur in libris de
re rustica, exeratq; à colendo agro in forum transiuerunt, Mane sa-
lutationibus, postea iudicis clientibusq; uacantes, exeratisq; usq; in
meridiam uocari, tribus horis ante solis occasum cenam inapiebant,
quam horam nonam uocabant, quæ apud nos uigesima prima sem-
per est. Romani enim imparibus urbatur horis de quibus Palladius
& Aldus in præfatione de re rustica. Huius nonæ horæ meminit Cice-
ro in epistolis libro nono cum dixit. Acqubueram horam nonam. & Hora-
tius in epistolis. Si cænas hodie mecum, ut libet, ergo ad nonam uenies.
& Martialis ad Eupheumum, in quo exeratia urbis per horas distin-
git in hunc modum, Prima salutares &c. Subdit, imperat extructos frã-
gere nonam thoros. horam et nonam Iuuenalis intellexit cum dixit. exul
ab octaua marinus bibit. i. post octauam, quod est hora nona. Ostendere
enim uoluit, Marium licet exulem Romano tñ more uitam ducere, & Ho-
mers in odissea inquit, qñ è cõsilio uir carne ad fercula surgit. Atq; fo-
ri lites diiudicat ordine multas. Pomeridianum tempus intelligit horam
scilicet nonam. hanc intellexit Maro cum dixit, Nunc eadem labente
die conuiuia quarit. hoc est ea hora qua Romani cenare cõsueuerunt,
& Horatius in odis inquit inclinare meridiem sentis, quasi hora iam ap-
pareret parare cene. Gregorius et Pont. illud Luce, hõ qdã fecit cœ-
nã magnã pbas idẽ et cū illo Mathæi ecce prædium meum parauit, ita ingt.

Quod uero per illum cœna, per hunc prandium dicitur, nequaquam
nostræ obsistit intelligentiæ, quia cum ad horam nonam apud anti-
quos quotidie prandium fieret, ipsum quoque prandium cœna uocaba-
tur. hunc etiam morem Pont. Christiani imitantes in diebus ieiunio cõ-
secratis non prius quàm hora nona, cibum capiendum decreuerunt.
Quod liquido. S. Thomas his uerbis manifestauit. Ieiunium ordi-
natur in deletionem culpæ, & cohibitionem. unde oportet quod ali-
quid addat supra communem consuetudinem, ita tamen quod per hoc
non multum natura grauetur, est autem communis consuetudo cor-
medendi hominibus circa horam sextam, tum quia iam uidetur esse cõ-
pleta digestio nocturno tempore, naturali calore interius reuocato pro-
pter frigus noctis circumstans & diffusio humoris per membra coopes-
cante ad hoc calore dici usque ad summum solis ascensum, tum etiam
quia tunc præcipue natura corporis humani indiget iuari contra ex-
teriorem aeris calorem, ne humores interius adurantur, & ideo ut iei-
unans aliquam afflictionem sentiat pro culpæ satisfactione conueniẽs
hora comedendi taxatur ieiunantibus circa horam nonam. Conuenit
etiam ista hora mysterio passionis Christi, quæ completa fuit hora nona,
hec Tho. In euangelio etiam scriptum est, & tenebre factæ sunt
ab hora sexta usque ad horam nonam. i. a meridie, usque ad tres horas
post meridiem, quam esse horam uigesimam primam diximus, horis non
æquinocetialibus acceptis, sed imparibus, ut apud antiquos Romanos
moris erat. Hanc etiam horam nonam in ieiunio confirmauit Reueren-
dissimus Card. Gaictanus, & huic opinioni calamo subscripsit. His igitur
clarissime patet cœnam Romanorum diurnam horam nonam fuisse
idest. xxi. quod facile indicat semel tantum ad saturitatem Romanos ue-
teres in die cibo usos esse. Non enim existimandum est bis in die potuisse
sumi, si hora nona erat hora cœnæ, sed eos ientasse. facile conædo,
quod cum Cornelius celsus mente sua euolueret huiusmodi morem ta-
xans libro primo suæ artis medicæ eo capite, in quo cauet, quæ sanos
facere conueniat, in hunc modum scripsit. Bis die potius, quàm semel cibum
capere, & semper quam plurimum diuimodo conquoquat. Aurea
quidem sententia, cui ratio patrocinetur. Qui enim cibi portionem na-
turæ adimit, quam facile conquoquere poterat, alimentum ei summo-
uet, quo diutius in uita permanere posset, hoc uero medicum sapiens
tem facere decet non aibi portiunculam subtrahere, & uitæ longitudi-
ni derogare, neque totius unicitæ abatione in naturæ onus subministra-
re. hanc

re. hanc etiam Romanorum cœnandi horam retulit Galenus, & usui
mandavit, cum in libro de tuenda valetudine historiam narrat. in qua
quid diebus illis, quibus lauabatur, se fecisse dicit. Nam cum spem ha-
beret balneum futurum esse hora tarda propter infirmorum occupatio-
nes, in mane solum panem comedebat. cœnabat autem hora. x. diuiso
die in. xiii. horas æquinoctiales, quæ erat. xxi. hora. Eundem etiam mo-
rẽ græcos sequutos fuisse cuius facile patet ex his, quæ supra narrata
sunt. Nos autem, qui bis ad saturitatem cibum sumimus ælsum sequen-
tes, de cœna sermonem facimus non diurna Romanorum, sed uesterna
& nocturna, & hanc intelligunt Arabes omnes, & medicorum iu-
niore, huius etiam meminit Haliabhas libro primo practice ca. vii. cū
dixit cœna hoc vitium habet, quod rheuma promocat, quod in diurna
accedere non potest. hallucinatus est itaq; Curtius cum Auicennam in
capite de epilepsia oppositum atq; Galeno contrariũ esse autumat, qui
in consilio de morbo comitali cuidam dari præcepit tertiam partem pa-
nis in mane & prandio & duas tertias in cœna. de ea enim cœna intel-
lexit Galenus, quæ diurna est, non nocturna, & quæ ægritudinibus
capitis ab humore dependentibus minime nocet, & quæ temporibus il-
lis in consuetudine erat. At cum Auicenna duas tertias in mane & ter-
tiam in cœna dari iussit, cœnam præcepit nocturnam, atq; uesternam,
ex qua portiunculam tibi demere est salubrius, quia copiosa noctis ali-
mentatio capitis materialibus dispositionibus mirificè nocet, licet Curtius ali-
ter & perperam intelligat, & quod in opere medicine nullam afferat
utilitatem. hæc fuit Arabum sententia, quam recentiores sequuntur no-
minis cœnæ significantiam hoc modo suscipientes. Nec igitur mirũ est
sed sanitati potius maxime conueniens, quod Alzaraius uir consum-
tissimus in cura catarrhi calidi iubet cœnam nocturnam diminuendam
esse, & in frigido summuendam, atq; prandium diminuendum. Si-
mili modo Halya. cum dixit, cœna hoc vitium habet quod rheuma pro-
uocat, subintulit. quod si patientes rheuma fuerint, et sint soliti cenare.
cœnent ante solis occasum, quibus in locis nocturnam cœnam copio-
sam capitis dispositionibus materialibus obesse testantur omnes. Nō igitur
(ut Curtius asserit) litera principis corrupta est, sed potius Curtij
mens, qui de principe sæpe male sentit. cum igitur theoremata in quali-
bet arte esse debeant affectiua finis, non erit in scientia medicine re-
ponendum id theorema, quod ad aliquid utile uitæ non conducatur. Ex-
plodenda est itaq; ex medicine libris, & ex medicorum scholis ex sibi

landa falsa & inutilis curtianorum opinio cum ne diu quod iuuamen-
tum afferat in tuenda ualitudine & curandis morbis, uerum noci-
mentum infert quamplurimum. Sed quod in Curtio maxime demior,
est quod illam irrefragabilem sententiam Galeni obliuioni mandarit,
ac præsertim in tuenda sanitate tua, cum talis ac tantus sis, & toti
Christiano gregi tam necessarius ac iam in prima constitutus senectus-
te, in qua consuetudinem mutare tentauerit. cui ueritas et Galeni opi-
nio aperte in faciem reclamationis cum dixit. Qui cuilibet rei insuescat ma-
gna ex parte nature sue conuenientem consuetudinem deligunt. pro-
pterea quod si non conueniant, subinde lesi ipsa repudiant. aliqui ue-
ro uel dulcedine ducti, uel præ nimia dementia non sentientes, se ledi
in prauis consuetudinibus persistunt. uerum hi pauci sunt. Plures qui
non persistunt. Quo magis rationabile est minus errare medicos, qui
omnem consuetudinem seruandam censent. Quam ob rem magis ac-
curate scripsit discipulus eius Odos, quam Curtius opere exequatur,
cum consuetos plus prandere quam cænare in sua conclusione uniuersis
falsi excipiendos esse indicauit.

Plura scripsurus essem, sed cum magna ex parte ad medicum spectent
dicenda reseruari uisus in nostra apologia, quam contra Curtium, cur-
tianosq; in lucem edemus, simulq; medicinalem, & finis medicine uti-
lissimam Dini Florentini questionem de cæna et prandio in publicum
manifestabimus. i qua hec, quæ modo dicimus, tanquam prologia,
& maximas dignitates haberi uolumus. Hec tamen sanctitati tue
sufficere mihi satis esse uidentur in manifestanda Curtij falsa et ad ope-
ra uite minime utili de cæna & prandio opinione.

Osculatur Sanctitatis tue pedes Beatissimos

Humillimus Scr.

Andreas mirinus de Piscia.

2000. The first of these is the fact that the
 system is not a simple one. It is a complex
 system, and it is not a simple one.

The second fact is that the system is not a simple one.
 It is a complex system, and it is not a simple one.
 The third fact is that the system is not a simple one.

The fourth fact is that the system is not a simple one.
 It is a complex system, and it is not a simple one.
 The fifth fact is that the system is not a simple one.

The sixth fact is that the system is not a simple one.
 It is a complex system, and it is not a simple one.
 The seventh fact is that the system is not a simple one.

The eighth fact is that the system is not a simple one.
 It is a complex system, and it is not a simple one.
 The ninth fact is that the system is not a simple one.

The tenth fact is that the system is not a simple one.
 It is a complex system, and it is not a simple one.
 The eleventh fact is that the system is not a simple one.

The twelfth fact is that the system is not a simple one.
 It is a complex system, and it is not a simple one.
 The thirteenth fact is that the system is not a simple one.

The fourteenth fact is that the system is not a simple one.
 It is a complex system, and it is not a simple one.
 The fifteenth fact is that the system is not a simple one.

The sixteenth fact is that the system is not a simple one.
 It is a complex system, and it is not a simple one.
 The seventeenth fact is that the system is not a simple one.

